

사용상의주의사항

1. 경고

- 1) 임신부가 비타민 A(레티놀)을 1일 5,000IU 이상 복용하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인은 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하지 말 것.(비타민 A 결핍증 환자는 제외)
- 2) 철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관한다. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락한다.

2. 다음 환자는 복용하지 않도록 할 것.

- 1) 이 약의 구성성분에 의해 과민반응이 나타난 적이 있는 환자
- 2) 간질환 환자
- 3) 과칼슘혈증 환자

3. 다음 경우에는 신중히 복용할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 과수산화염소증 환자
- 3) 임부, 수유부
- 4) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상담할 것.

- 1) 중증질환, 알레르기, 다른 질환의 치료를 위해 다른 약을 복용하고 있는 경우
- 2) 임신부(특히 임신초기) 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인

5. 부작용

1) 이 약의 복용에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있다. 출혈이 오래 지속된 경우에는 의사 또는 약사와 상의해야 한다.

2) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상, 과요산혈증, 간손상을 일으킬 수 있다.

3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.

4) 장기간 고용량을 복용할 경우 내성이 생길 수 있다.

5) 피리독신을 1일 50mg~2g의 용법으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상이 나타날 수 있다.

6. 복용시 다음에 주의할 것.

1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.

2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 비타민 A로서 1일 5,000IU 이상을 넘지 않도록 한다.

3) 본제의 복용에 의한 부작용으로 드물게 두통, 경미한 위장장애, 피부알러지 등이 나타날 수 있다.

4) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.

5) 출혈성 소인이 있는 환자 또는 항혈소판제 및 항응고제와 병용치료하는 환자에게 사용하기 전에 의사와 상의한다. 수술 3~4일전에 이 약의 투여를 중단한다.

7. 임부·수유부의 복용

1) 외국에서 임신전 3개월로부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000IU 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신을 희망하는 부인은 비타민 A 결핍증 치료에 사용되는 경우를 제외하고는 이 약을 복용하지 말아야 한다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 1일 5,000IU 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 기울여야 한다.

2) 모유에 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

8. 임상검사치에의 영향

1) 각종 뇨검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.

2) 뇨의 황변으로 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

9. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.

3) 오용을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.