

사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 사람
- 2) 12세 미만의 어린이

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

혈액응고억제제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

알레르기 환자, 다른 약을 복용하고 있는 환자

출혈성 소인이 있는 환자 또는 항혈소판제 및 항응고제와 병용치료하는 환자에게 사용하기 전에 의사와 상의한다. 수술 3~4일전에 이 약의 투여를 중단한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용으로 이상반응이 나타나는 경우
- 2) 드물게 어지럼, 두통 또는 피부 홍조, 매우드물게 위부불쾌감이 나타난 경우
- 3) 장기간 사용으로 출혈이 나타날 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

정해진 용법·용량을 지킬 것.

6. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 없고 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.