

# 사용상의주의사항

## 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 갑상선기능항진증 환자
- 2) MAO저해제(억제제)를 투여 중인 환자
- 3) 악성 고혈압 환자
- 4) 중증(심한 증상) 빈맥(빠른맥) 환자

## 2. 부작용

- 1) 은행엽 엑스로 인한 부작용 : 매우 드물게 알레르기성 피부반응 등을 포함하는 아나필락시스 반응, 두통, 위장관질환, 빈도 불명의 고혈압 등이 나타날 수 있다.
- 2) 헵타미놀로 인한 부작용 : 발적(충혈되어 붉어짐), 드물게 빈맥(빠른맥)이 나타날 수 있다.

## 3. 일반적주의

- 1) 헵타미놀염산염이 함유되어 있으므로 중증(심한 증상)의 동맥성 고혈압 환자에 투여할 경우에는 동맥압을 신중히 관찰한다.
- 2) 급성 치질 환자에게 사용하며 다른 항문질환에까지 효과가 나타나는 것은 아님을 주의한다. 증상이 신속히 개선되지 않는 경우에는 항문과 전문의의 진료를 받은 후 치료를 수정한다.
- 3) 헵타미놀염산염은 이 약을 사용하는 운동선수에게 도핑테스트에서 양성반응이 나타날 수 있으므로 주의한다.
- 4) 출혈성 소인이 있는 환자 또는 항혈소판제 및 항응고제와 병용치료하는 환자에게 사용하기 전에 의사와 상의한다. 수술 3~4일전에 이 약의 투여를 중단한다.
- 5) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 6) 1개월간 투여하여도 증상의 개선이 나타나지 않을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 7) 소아에는 투여하지 않는다.

## 4. 상호작용

이 약은 헵타미놀염산염을 함유하므로 MAO저해제(억제제)와 병용(함께 복용)투여시 혈압상승이 나타날 수 있다.

#### 5. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 동물실험에서 기형발생은 나타나지 않았다. 사람의 경우에도 임신 첫 3개월까지의 조사에서 위험도가 알려져 있지 않으며, 어떤 기형유발효과도 특별히 발견되지 않았다. 은행업엑스의 항응고 작용과 헵타미놀의 혈관작용 특성을 고려하여, 임부에게 사용하지 않아야 한다.

2) 모유로 이행한다는 보고는 없으나 수유기간동안 사용하지 않는다.

#### 6. 과량투여시의 처치

과량 또는 고의에 의해 이 약을 과량투여하는 경우에는 동맥압 및 심박동을 잘 관찰한다.

#### 7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.