

사용상의주의사항

1. 경고

로알제리가 함유된 제제 사용으로 인하여 천식 및 심각한 알레르기 증상등의 부작용이 나타났다는 외국의 보고가 있으므로 천식 및 알레르기 환자는 복용하지 말 것.

2. 다음 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.

- 1) 1세 미만의 유아
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 지금까지 약에 의한 알러지증상(발진, 발적, 가려움 등)이 있었던 사람

3. 복용시 다음 사항에 주의할 것

- 1) 정해진 용법. 용량을 지킬 것
- 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것

4. 부작용

- 1) 이 약의 투여에 의해 다음과 같은 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.- 위 부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 식욕부진, 복부팽만감
- 2) 이 약의 투여에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있다. 출혈이 오래 지속된 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 지킨다.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 출혈성 소인이 있는 환자 또는 항혈소판제 및 항응고제와 병용치료하는 환자에게 사용하기 전에 의사와 상의한다. 수술 3~4일전에 이 약의 투여를 중단한다.

6. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것
- 3) 오용을 피하고 품질을 보호, 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것