

사용상의주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 갑상선기능항진증 환자
- 2) MAO저해제(억제제)를 투여 중인 환자
- 3) 악성 고혈압 환자
- 4) 중증(심한 증상) 빈맥(빠른맥) 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

1) 은행엽 엑스로 인한 부작용 :

매우 드물게 알레르기성 피부반응 등을 포함하는 아나필락시스 반응, 두통, 위장관질환, 빈도 불명의 고혈압 등이 나타날 수 있다.

2) 헵타미놀로 인한 부작용 :

발적(충혈되어 붉어짐), 드물게 빈맥(빠른맥)이 나타날 수 있다.

4. 일반적주의

1) 헵타미놀염산염이 함유되어 있으므로 중증(심한 증상)의 동맥성 고혈압 환자에 투여할 경우에는 동맥압을 신중히 관찰한다.

2) 급성 치질 환자에게 사용하며 다른 항문질환에까지 효과가 나타나는 것은 아님을 주의한다. 증상이 신속히 개선되지 않는 경우에는 항문과 전문의의 진료를 받은 후 치료를 수정한다.

3) 헵타미놀염산염은 이 약을 사용하는 운동선수에게 도핑테스트에서 양성반응이 나타날 수 있으므로 주의한다.

4) 출혈성 소인이 있는 환자 또는 항혈소판제 및 항응고제와 병용치료하는 환자에게 사용하기 전에 의사와 상의한다. 수술 3~4일전에 이 약의 투여를 중단한다.

5) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.

6) 1개월간 투여하여도 증상의 개선이 나타나지 않을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.

7) 소아에는 투여하지 않는다.

5. 상호작용

이 약은 헵타미놀염산염을 함유하므로 MAO저해제(억제제)와 병용(함께 복용)투여 시 혈압상승이 나타날 수 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 동물실험에서 기형발생은 나타나지 않았다. 사람의 경우에도 임신 첫 3개월까지의 조사에서 위험도가 알려져 있지 않으며, 어떤 기형유발효과도 특별히 발견되지 않았다. 은행엽엑스의 항응고 작용과 헵타미놀의 혈관작용 특성을 고려하여, 임부에게 사용하지 않아야 한다.

2) 모유로 이행한다는 보고는 없으나 수유기간 동안 사용하지 않는다.

7. 과량투여시의 처치

과량 또는 고의에 의해 이 약을 과량투여하는 경우에는 동맥압 및 심박동을 잘 관찰한다.

8. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관 한다.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.