

사용상의주의사항

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 본제나 다른 해열제를 복용해야 하는 경우, 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이런 사람이 본제를 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다. 한 달에 이 약을 10일 이상 사용시 두통이 악화될 수 있다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것.

이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량 (4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.

3. 다음 환자는 복용하기 전에 의사 · 약사와 상의할 것.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 의심되는 어린이와 청소년 : 아스피린과 관련된 것으로 보고된 바 있는 레이증후군에 대하여 상의한다.
- 2) 아스피린에 알레르기 증상을 나타내거나 천식 또는 속쓰림, 소화불량, 위통 또는 위궤양이나 출혈이 일어나는 사람
- 3) 임부 또는 수유부
- 4) 항응고제, 당뇨병, 통풍, 관절염 치료제를 사용하고 있는 환자.

4. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것.

- 1) 본제를 진통제로서 10일 이상, 해열제로서 3일 이상 연용하지 않는다.
- 2) 임부 : 임신기간 중 마지막 3개월 간은 아스피린을 사용하지 말 것.

5. 복용중 또는 복용 후의 주의사항

- 1) 통증이나 발열이 지속되거나 악화되는 경우 또는 그밖의 다른 증상이 나타나는 경우, 발적 또는 부종이 나타나면 의사 · 약사와 상의한다. (치통은 치과의사와 상의)
- 2) 귀울림이나 청력이 감소하는 경우 의사 · 약사와 상의한다.
- 3) 부주의로 과량복용시 즉시 의사 · 약사의 도움을 받는다.

6. 저장상의 주의사항

어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.