



◎ 2020년 2차 약사위원회 통과 약물 ◎

코드	약품명(제약)	구분	성분	효능	용법	비고
MPEDI	페디라산 6.264그램/포	원내외	potassium citrate 432mg (408mg as potassium citrate anhydrous) sodium chloride 410mg sodium citrate 172mg glucose 5g	영·유아 및 소아의 설사 시 수분과 전해질의 보급·유지.	1포를 물 200ml에 녹임. 성인, 노인 : 처방에 따라 40ml/kg/day. 유아, 소아 : 100~150ml/kg/day 분복	
MZOS1	조스정 1mg	원내외	eszopiclone	불면증	가장 낮은 유효용량 사용. 성인 권장량 1일 1mg. 필요시 2~3mg으로 증량가능.	향정
MZOS2	조스정 2mg		eszopiclone			
MZOS3	조스정 3mg		eszopiclone			
ISKYPFS	스카이리치PFS	원내	risankizumab 75mg/0.83ml	광선요법 또는 전신치료요법을 필요로 하는 중등도-중증의 성인 판상 건선의 치료	이 약은 1회 150mg (75mg을 2회 주사)을 0주, 4주, 그 이후에는 12주마다 한 번씩 피하 투여한다.	냉장
MVELPH	벨포로추어블정	원내외	sucroferic oxyhydroxide 2500mg	혈액투석 또는 복막투석을 받고 있는 만성신장질환자의 혈청인 조절	1일 3정 (철로서 1,500 mg), 매 식사와 함께 1정씩 씹어서 복용 1일 최대 6정 (철로서 3,000 mg).	
MDOBA	도바토정	원내	dolutegravir sodium (micronized) 52.6mg (50mg as dolutegravir) + lamivudine 300mg	인체면역결핍바이러스 (HIV-1) 감염 치료.	12세 이상(40kg 이상) 1일 1회, 1정.	
MDUKR1	듀카로정 30/5/5mg	원외 전용	fimasartan 30mg amlodipine 5mg rosuvastatin 5mg	피마사르탄/ 암로디핀복합제 피마사르탄 단독으로 적절히 조절되지 않는 본태성고혈압	1일 1회 1정. 식사와 관계없이 매일 같은 시간 복용.	
MDUKR2	듀카로정 30/5/10mg		fimasartan 30mg amlodipine 5mg rosuvastatin 10mg			
MDUKR3	듀카로정 60/5/5mg		fimasartan 60mg amlodipine 5mg rosuvastatin 5mg			
MDUKR4	듀카로정 60/5/10mg		fimasartan 60mg amlodipine 5mg rosuvastatin 10mg			

코드	약품명(제약)	구분	성분	효능	용법	비고
MTRUS1	트루셋정 40/5/12.5	원외 전용	telmisartan 40mg amlodipine besylate 5mg chlorthalidone 12.5mg	텔미사르탄과 암로디핀의 복합요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압	1일 1회 1정. 식사와 관계없이 매일 같은 시간 복용.	
MTRUS2	트루셋정 80/5/12.5		telmisartan 80mg amlodipine besylate 5mg chlorthalidone 12.5mg			
MTRUS3	트루셋정 80/5/25		telmisartan 80mg amlodipine besylate 5mg chlorthalidone 25mg			
ICAR1	카티라이프 1syr	원내	바슬자가연골유래연골세포 $\times 10^7$ 이상 개	무릎 연골결손 (ICRS grade III 또는 IV, 결손면적 2 내지 10cm ²) 의 치료	성인의 무릎 관절 연골 결손 부위에 깊이를 고려한 결손 용적 1cm ³ 당 1개 프립덱스리인지 (2.0~5.0×107개 세포)를 이식	냉장
ICAR2	카티라이프 2syr					
ICAR3	카티라이프 3syr					
ICAR4	카티라이프 4syr					
IIIMFIN1	임핀지주 120	원내	durvalumab 120mg/2.4ml	백금 기반 동시적 항암화학방사선요법 이후 질병이 진행되지 않은 절제불가능 한국소진행성비소세포폐암	10mg/kg, 2주 간격으로 60분에 걸쳐 정맥 점적 주입	2~8℃ 에서 차광 하여 보관
IIIMFIN2	임핀지주 500		durvalumab 500mg/10ml			
MVERZE1	버제니오정 50mg	원내외	abemaciclib 50mg	호르몬 수용체 (HR)-양성 및 사람 상피세포 성장인자 수용체 2(HER2)-음성인 진행성 또는 전이성 유방암의 치료	풀베스트란트 또는 아로마타제 억제제 병용 요법 : 본제 150mg 1일 2회.	
MVERZE2	버제니오정 100mg		abemaciclib 100mg			
MVERZE3	버제니오정 150mg		abemaciclib 150mg			

2020년 8월 16일부터 사용 가능합니다

페디라산



1. 성분명 및 함량 / 코드

potassium citrate 432mg
(408mg as potassium citrate anhydrous)
sodium chloride 410mg sodium citrate 172mg
glucose 5g

2. 약리작용

유소아의 설사로 인해 발생하는 체액과 전해질의 손실을 보정하기 위해 수분과 전해질을 보급

- 포도당 : 소장에서 나트륨의 흡수를 용이하게 하여 결과적으로 수분의 흡수를 유도
- 나트륨과 칼륨 : 설사 또는 구토로 인한 손실된 나트륨과 칼륨을 공급
- 구연산 : 설사와 탈수로 인해 초래된 산성증을 바로 잡아주고 소장에서 나트륨의 흡수를 증가

3. 적응증

영·유아 및 소아의 설사 시 수분과 전해질의 보급·유지.

4. 용량 및 용법

1포를 물 200ml에 녹임.
성인, 노인 : 처방에 따라 40ml/kg/day.
유아, 소아 : 100~150ml/kg/day 분복

5. 금기

- 1) 펍뇨, 빈뇨, 무뇨 등을 수반한 신부전 환자.
- 2) 장폐쇄, 무력장폐쇄 또는 장천공 환자.
- 3) 조절이 어려운 구토 환자.
- 4) 비경구투여가 필요한 중증 탈수 환자.

6. 일반적주의

- 1) 펍뇨, 빈뇨, 무뇨 등을 수반한 신부전 환자.
- 2) 장폐쇄, 무력장폐쇄 또는 장천공 환자.
- 3) 조절이 어려운 구토 환자.
- 4) 비경구투여가 필요한 중증 탈수 환자.

이 약은 영·유아 및 소아에게 투여하며 의사의 판단에 따라 성인에게 투여할 수 있다.

이 약의 용량은 환자별로 의사의 권고에 따라 개별화될 수 있다.
1포를 물에 녹여 200mL를 만든다(산제에 한함).

- ① 성인, 고령자 : 처방에 따라 1일 체중 kg당 40mL를 투여한다.
- ② 유아, 소아 : 1일 체중 kg당 100~150mL를 나누어 투여한다.
- ③ 모유먹는 영아 : 다음표와 같이 우유먹는 영아와 동일하게 투여한 후 모유를 충분히 먹이고 남은 모유는 짜낸다.
- ④ 우유먹는 영아 : 설사를 하면 먼저 우유 및 그 외 인공유 등 모든 음식섭취를 중단하고, 24시간 이상 설사가 계속되면 소아과 의사와 상의한다. 24~48시간 후 증세가 호전되면 정상적인 섭생을 점차로 실시함. 처방은 다음 표와 같고 구역, 구토가 생기는 경우 소량씩 자주, 한모금씩 투여한다.

(체중 : kg)

	이 약의 용량 ml	우유량 ml	1일 총량ml
첫째날	150*체중	0	150*체중
둘째날	120*체중	30*체중	150*체중
셋째날	90*체중	60*체중	150*체중
넷째날	60*체중	90*체중	150*체중
다섯째날	30*체중	120*체중	150*체중
여섯째날	0*체중	150*체중	150*체중

7. 보관 및 취급시 주의사항

- 1) 경구투여만 가능하다.
- 2) 보존제를 함유하지 않으므로 일단 개봉하여 사용후 남은 것은 폐기한다.

8. 저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

약제부 게시판

◎ 약품 품질 및 생산 중단 및 사용 개시 ◎

의약품	사유		대체약품
스테리텔크 파우더 4G	코로나로 인한 공급지연으로 인해 공급 일시 중지됨	재고 소진 후 코드 불용	스테리텔크파우더 2g은 정상공급가능
렐레팍트LH-RH	제약사의 수입 일정 차질로 인한 일시 품질	일시품질	7월 중순 이후 재 공급
테라마이신 안연고	제약사의 생산일정 지연으로 인한 품질 연장	일시품질	2020년 9월 이후 재 공급
페가시스프리필드주 135mcg, 180mcg	수요감소로 인한 제조사 공급 중단 결정	코드 불용	
에토미데이트 주	제약사의 내부 사정으로 인해 약품 공급에 차질		월 300ample 공급 예정
덱스트란40	원료 자재의 수급이 원활하지 않아 생산 공급이 중단	재고소진 후 코드 불용	대체약품 없음
바크로비정, 바크로비크림	제약사 내부 정책에 따라 6월 말까지 공급 후 공급 중단 예정	공급중단	대체약품은 추후 공지 예정임
파라마셋, 파라마셋세미정	7월 중순까지 품질예정임	품질예정	
가베트정	생산중단이 결정 코드 불용 예정임	생산중단	원내 동일 효능 약 다수 처방이 가능함
이수푸렐주 0.2mg	생산중단결정 2020년 9월 공급 중단 예정임	생산중단	
2%헥시타놀액	산업 안전 보건법에 의거 제품 내 일부 성분의 안정성 문제가 발생		그린 헥시디놀2% EHXI2

◎ 약제부 동정 ◎

– 7월 17일 강민구 약사님이 퇴사하셨습니다. 수고하셨습니다.

◎ 부작용 보고건수 ◎

월별	원내보고	의사	약사	간호사	약물상담	카드발급
4	305	13	10	282	50	0
5	281	15	16	250	55	2
6	306	16	11	279	81	1

※ 부작용 보고에 관심을 가져주셔서 감사합니다. 지속적인 관심 부탁드립니다.



의약정보

조선대학교병원 의약정보지 2020. 7

PHARMACY NEWSLETTER OF THE CHOSUN UNIVERSITY HOSPITAL

조선대학교병원 약제부 의약정보실

발행인 : 장혜영

편집위원 : 박선희, 김경혜