

◎ 약품 품질 및 사용 중단 ◎

의약품	사유	대체약품
아주 베셀 듀 에프 연질 캡셀	원 개발사의 원료가 인상에 따른 생산 지연으로 장기 품질됨	원내 재고량 보유로 인하여 현재 코드 불용 없이 사용 중 . 추후 대체약 안내 예정임
영풍 독시사이클린정100mg	원료 수급 문제로 인하여 5월 단기 품질 예정	원내 재고량 보유로 인해 코드 불용 없이 사용 예정
디스코비스크주	원내 재고량 보유로 인해 코드 불용 없이 사용 예정	프로비스크 사용 가능
에토미데이트 주	제조사의 원자재 확보 어려움으로 인해 21년 12월까지 품질됨	재 공급시점 : 22년 상반기
본비바플러스 정	약품 공급 이후 재 공지 예정	프로비스크 사용 가능
아프로벨정 300mg	수입 중단 및 제조사의 생산라인 정비로 인한 장기 품질 예정	아프로벨 150mg은 정상 공급됨
카르민주	재 공급 시점 : 22년 상반기	재고 소진 시까지 사용 예정 대체약품은 추후 공지 예정임
씨스코 이알서방정 10mg, 20mg	원료 수급 불안정으로 인해 생산중단(코드불용)	동일 효능군 약품 사용 가능
님벡스주	제조 공급사의 생산성 문제로 인하여 20년 11월 이후 국내 유통 중단 포함	원내 재고 소진 시 코드 불용 예정임 대체약품은 해당 과와 논의 후 재 공지 예정
녹십자 수두백신	원내 재고 소진 시 코드 불용 예정임 대체약품은 해당 과와 논의 후 재 공지 예정	SK바리셀라주, 코드 : ISKSUDU
아데라빈주	공급중단	레보멜스주, 코드 : ILEVOM
헥렘 키드액 45ml	생산 및 판매중단	재고 소진 후 헥렘 키드 60ml 준비 예정
대한무수에탄올	19년 9월 19일자로 허가 취하되어 유효기간이 끝나는 21년 3월 19일자로 코드 불용 예정임	대체약품 없음
칸데모어플러스정 16/12.5	허가취하/안전성문제	동일 효능 군 약품 사용 가능
디카맥스정	변경 허가를 받지 않고 첨가제 임의 사용	동일 효능 군 약품 사용 가능
카슈트현탁액(원외)		
리리카캡슐 25mg		

◎ 부작용 보고건수 ◎

월별	원내보고	의사	약사	간호사	약물상담	카드발급
4	393	15	38	340	165	4
5	35	9	18	323	180	3

※ 부작용 보고에 관심을 가져주셔서 감사합니다. 지속적인 관심 부탁드립니다.



의약정보

2021. 5
Vol.25 No.2

◎ 2021년 1차 약사위원회 통과 약물 ◎

코드	약품명(제약)	구분	성분	효능	용법/용량
IBYFAVO	바이파보주 50mg (황정)	신규 원내	remimazolam besylate 59.37mg/405.7mg (51mg as remimazolam)	성인에서 전신마취의 유도 및 유지	6mg/kg/hr(0.1mg/kg/min) 또는 12mg/kg/hr(0.2mg/kg/min)로 시작하여 점적 정주
IVSIP150	비지파크 320주 150ml	용량 추가 원내	iodixanol 652mg/mL (320mg as iodine)	조영술에 X 선조영제	동맥, 정맥, 척수강, 체강내로 투여 가능
MLYRICR1	리리카CR 서방정 82.5mg	용량/제형 추가 원외	pregabalin 82.5mg	성인에서 말초 신경병증성 통증의 치료	1일 1회, 저녁 식후 투여. 초회량 1일 1회 165mg, 3~7일 후 1일 1회 330mg까지 증량 가능, 7일 간격으로 Max : 660mg
MARCX	알록시아정 30mg	용량추가 원내전환	etoricoxib 30mg	골관절염(퇴행관절염)의 증상이나 징후의 완화.	1일 1회 30mg.
MNOCD25	녹더나설하정 25mcg	신규 원내외	25mcg : desmopressin acetate 0.028mg	성인의 특발성 야간 다뇨로 인한 야간뇨 증상의 치료.	남성 : 1일 1회 50mcg, 취침 1시간 전 물 없이 설하 투여 여성 : 1일 1회 25mcg, 취침 1시간 전 물 없이 설하 투여
MNOCD50	녹더나설하정 50mcg		50mcg : desmopressin acetate 0.057mg		
EALLEPA	알레파타딘 점안액 0.2%	신규 원외	olopatadine hydrochloride 2.22mg/mL (2mg as olopatadine)	알러지성 결막염으로 인한 증상 치료. 1회용 약제임	1회 1적 1일 2회 점안. 최대 4개월
EALIMUS	알리무스 점안액 0.1%	신규 원외	tacrolimus hydrate1.02mg	눈꺼풀 결막에 거대유두 증식이 있는 봄철 각 결막염	1회 1적, 1일 2회 점안
MEASY 0.5	이지렉트정 0.5mg	신규 원외	rasagiline besylate 0.78 (rasagiline0.5mg)	강력한 선택적 비가역적 MAO-B 억제제 특발성 파킨슨병의 치료	단독 또는 도파민 효능제 보조요법 : 1일 1회 1mg
IIVGSN50	아이비글로불린 SN주 10% 50ml	용량추가 원내	human immunoglobulin G 100mg/mL	저 및 무감마 글로불린혈증, 중증 감염증에 항생물질 병용, 가와사키병, 길랑바레증후군	증상에 따라 사용
MNORZ2	노자임캡슐 10000	신규 원내외	pancreatin enteric coated microtablet 162.7mg	췌장 외분비 기능장애	1회 2~4캡슐 (지방소화력단위 20000~40000EP단위), 1일 3회 식사중
IGROW2	그로트로핀 투 주사액 카트리지20IU	대체 원내	somatropin 11.1IU/mL	뇌하수체 성장 호르몬 분비 장애로 인한 소아의 성장 부전, 소아의 특발성 저신장증(ISS).	증상에 따라 사용 ※ 싸이젠 리퀴드 카트리지 대체임
MFORL4	폴락스 산 4g	용량추가 원외	polyethylene glycol 4000 4g	소아의 변비 증상 치료	6개월~만 1세 : 4g 만 1~4세 : 1~2포(4~8g) 만 4~8세 : 2~4포(8~16g)
EDUOBEX	듀오벡스 액	신규 원외	clobetasol propionate 50mg/100g	중등도-중증의 두부 건선	1일 1회 병소 부위 도포, 15분 후 물에 적셔 거품내고 행균. 치료는 최대 연속 4주.
EDERMOL	더모타손 MLE 로손	신규 원내외	mometasone furoate1mg/g 60g/tube	코르티코이드에 반응하는 피부 질환의 가려움 및 염증 완화.	1일 1회, 환부에 얇게 도포 후 가볍게 문지름.
MMELAER	영진 멜라토닌 서방정 2mg	대체 원내외	melatonin 2mg	수면의 질이 저하된 55세 이상의 불면증 환자의 단기치료.	1일 1회 1정, 식사 후 취침 1~2시간 전, 씹거나 부수지 않고 통째로 복용. 최대 13주까지 투여. ※ 서카딘 대체약품임



코드	약품명(제약)	구분	성분	효능	용법/용량
MPALRIS3	팔리스펜 서방정 3mg	제조사 추가 원외	paliperidone 3mg, 6mg, 9mg	정신분열증의 치료, 정신분열정동 장애의 급성 치료	1. 정신분열증 만 18세 이상 : 1일 1회(아침) 6mg. 증량시 최소 5일 간격으로 1일 3mg씩 증량. 2. 정신분열정동장애 성인 : 1일 1회(아침) 6mg. 증량시 최소 4일 간격으로 1일 3mg씩 증량.
MPALRIS6	팔리스펜 서방정 6mg				
MPALRIS9	팔리스펜 서방정 9mg				
MTELM20	텔미트렌정 20mg	신규 원내외	telmisartan 20mg	본태성고혈압, 심혈관 질환의 위험성 감소	1일 1회 40mg. 최대 1일 1회 80mg.
IPARI	파리시톨주	제조사 추가 원내	paricalcitol 5μg/ml	만성 신부전과 관련된 이차적 부갑상샘 기능 항진증의 치료 및 예방	초회 2일 1회 또는 이보다 빈번하지 않은 빈도로 투석 시 0.04~0.1μg/kg(2.8~7μg) 일시주사. 필요시 2~4주 간격으로 2~4μg씩 증량
MPIRES2	피레스코정 200mg	신규 원외	pirfenidone 200, 400, 600mg	특발성 폐 섬유증의 치료.	초기용량 : 1회 200mg, 1일 3회 식후 복용. 2주 간격으로 1회 200mg씩 증량하여, 1회 600mg, 1일 1800mg까지 증량가능. ※ 파이브로 400mg, 600mg 대체임
MPIRES4	피레스코정 400mg	대체 원외			
MPIRES6	피레스코정 600mg				
IBENLY1	벤리스타주 120mg	신규 원내	belimumab 120mg, 400mg	표준요법으로 치료 중인 자가항체 양성인 활동성 전신 홍반 루푸스 성인 환자의 치료.	10mg/kg를 1시간에 걸쳐 정주. 초기 3회는 2주 간격으로 투여, 이후에는 4주 간격으로 투여
IBENLY2	벤리스타주 400mg				
IREMPEN	램시마펜	제형 추가 원내	infiximab 120mg	성인 크론병, 중증도~중증의 궤양성 대장염, 강직성 척추염, 류마티스관절염	성인 : 적응증에 따라 3~5mg/kg 첫 정맥 투여 후 2주 후 정맥투여, 이후 4주 후에 120mg 피하투여, 매 2주 마다 120mg 피하투여
MJARD25	자디양정 25mg	용량 추가 원외	empagliflozin 25mg	성인 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절을 향상시키기 위해 식사 요법 및 운동요법의 보조제로 투여	단독요법 및 인슐린 등 다른 혈당 강하제와의 추가 병용요법 : 1일 1회 10 mg. 필요시 1일 1회 25mg 식사와 관계없이 정제를 통째로 삼켜서 복용
MSYN50	씬지록신 50mcg	용량 추가 원외	levothyroxinesodiumhydrate 0.05mg, 0.075mg, 0.1mg, 0.15mg	갑상선 기능 저하증, 점액부종, 크레틴병, 단순성 갑상선종	성인 1일 1회 25~400μg. 초회 25~100μg, 유지 100~400μg.
MSYND75	씬지록신 75mcg				
MSYN100	씬지록신 100mcg				
MSYN150	씬지록신 150mcg				
MIMUT2	이무테라정 25mg	용량 추가 원외	azathioprine 25mg	신장 이식 후 거부반응 억제 자가 면역 질환	신장 이식 후 : 초기 3~5mg/kg, 유지 0.5~2mg/kg. 자가 면역 질환 : 2.0~2.5mg/kg.
MPENTG1	펜타사 서방 과립1g	제형추가 원내외	mesalazine 1g mesalazine 2g	경증에서 중증도의 궤양성 대장염, 크론병의 치료	썩지 말고 혀에 부은 후 물이나 주스와 함께 삼킴
MPENTG2	펜타사 서방 과립 2g				
MINVEL	인벨라정	제조사 추가 원내외	sevelamer carbonate 800mg	투석을 받고 있는 만성신장질환환자의 혈청인 조절.	1일 3회 식사와 함께 복용
MLONS15	론서프정 15mg	신규 원내외	trifluridine15mg tipiracilhydrochloride7.065mg trifluridine20mg tipiracilhydrochloride9.42mg	1. 전이성결장직장암 2. 전이성위암	아침, 저녁 식후 1시간 이내에 물과 함께 복용. 성인 : 초기용량 약 35 mg/m2/회, 1일 2회 아침, 저녁 식후 5일간 연속투여, 그후 2일간 휴약. 이를 2번 반복 후 14일간 휴약 최대 1회 투여량 80mg.
MLONS20	론서프정 20mg				

코드	약품명(제약)	구분	성분	효능	용법/용량
MERTIN1	엘티닙정 100mg	대체 원내외	aserlotinib hydrochloride 109.29mg (100mg aserlotinib), 163.93mg (150mgaserlotinib)	비소세포폐암 : 이전 화학 요법에 실패한 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암, EGFR 활성 변이가 있는 국소 진행성 또는 전이성 비소세포 폐암의 1차 치료.	비소세포폐암 : 1일 1회 150mg, 식전 최소 1시간이나 식후 최소 2시간에 복용. 췌장암 : 젬시타빈과 병용하여 1일 1회 100mg, 식전 최소 1시간이나 식후 최소 2시간에 복용 ※ 타세바 100mg, 150mg 대체임
MERTIN2	엘티닙정 150mg				
MANAST	아나스토정	제조사추가 원내외	anastrozole 1mg	폐경기 이후 여성의 진행성 유방암의 치료 호르몬 수용체 양성인 폐경기 이후 여성의 조기 유방암 보조치료	성인 : 1일 1회 1mg.
ISAMFE2	삼페넷주 440mg	제조사 추가 원내외	trastuzumab 440mg	전이성 유방암	증상에 따라 사용
IDAPTO350	보령 답토마이신주 350mg	신규 원내	daptomycin 350mg,500mg	성인의 그람양성균에 의한 복합성 피부 및 피부 연조직 감염 성인의 Methicillin 감수성 균주 및 내성 균주에 의한 right-side 심내막염을 포함하는 Staphylococcus aureus 균혈증	1. 성인의 복합성 피부 및 피부 연조직 감염 : 본제 4mg/kg 24시간마다 정주, 7~14일간 연속투여. 2. 성인의 Methicillin 감수성 균주 및 내성 균주에 의한 Staphylococcus aureus 균혈증 치료 : 본제 6mg/kg 24시간마다 정주, 최소 2~6주간 연속투여
IDAPTO500	보령 답토마이신주 500mg				
MMONU	모누를산	원내 전환	fosfomycin trometamol 3g/8g	방광염·요도염 등 요로감염증, 무 증후성 세균뇨, 수술 전·후 요로감염 방지.	성인 : 1회 3g 복용. 방지 : 수술 3시간 전/24시간 후 3g(역가) 복용. 물 반 컵 또는 비알콜성 음료에 용해 후 공복 시 복용. 가능하면 취침 전 방광이 빈 상태에서 복용.
ECRAV2	크라비트 점안액 1.5%	용량 추가 원내외	levofloxacin hydrate 15mg/mL	안검염, 맥립종, 누낭염, 결막염, 검판선염, 각막염, 각막궤양, 안과 수술시의 무균화요법.	1회 1적, 1일 3회 점안.
ISMP1	스모프카비벤 페리페랄 1206ml	제조사추가 원내	1000mL중 A액(포도당주사액 13%) : dextrosemonohydrate 143g B액 아미노산주사액 10%+전해질 외	경구 또는 위장관 영양 공급이 불가능, 불충분 하거나 제한되어 경정맥 영양공급을 실시해야 하는 2세 이상 및 성인에게 칼로리, 아미노산, 필수 지방 및 오메가-3 지방산의 보급	12세 이상 및 성인 - 정상 영양상태 또는 경증의 대사적 스 트레스 상태 : 아미노산으로서 0.6~0.9 g/kg/day - 영양 불균형에 관계없이 중등도내지 고 도의 대사적 스트레스 상태: 아미노산으 로서 0.9~1.6 g/kg/day
IOLIN9E	올리멜N9E 1000ml	신규 원내	A액 200ml 중 : complex of the purified olive oil and soybean oil (8:2) 40g B액 400ml 중 : L-alanine 8,24g 외	경구 또는 위장관 영양공급이 불가능 또는 불충분하거나 또는 제한되어 경정맥 영양공급을 실시해야 하는 만 2세 이상 소아 및 성인 환자들에게 수분, 전해질, 아미노산 및 칼로리 보급.	1일 권장량 : 질소로서 0.16~0.35g/kg (아미노산으로서 1~2g/kg). 총 열량으로서 20~40kcal/kg. 총 투여용량으로서 20~40mL/kg 또는 소비한 kcal당 1~1.5mL.
MZEMTSR1	제미메트 서방정 25/1000	원내 전환	gemigliptin 25mg/metformin 1000mg	제미글립틴과 메트포르민의 병용투여가 적절한 성인 제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 개선시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로서 투여	25/500mg 서방정 또는 25/1000mg 서방 정은 1일 1회, 1회 2정 복용 1일 최대 제미글립틴 50mg 및 서방성 메트포르민 2,000mg ※ 가브스메트 (50/1000) 원외 전환