



의약정보

2021. 11
Vol.27 No.4

○ 2021년 3차 약사위원회 통과 약물 ○

코드	약품명(제약)	구분	성분	효능	용법/용량
DZINC	징크셀 캡슐	신규 원내외	sodium selenite pentahydrate 0.666mg (200µg selenium) zinc oxide 62.244mg (50mg as Zn)	아연의 보급 항산화 면역증진 염증억제	만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1캡슐 복용한다.
DMASIS	마시본에스액	신규 원내외	alendronate sodium hydrate 91.4mg /20mL (70mg as alendronic acid)	폐경 후 여성의 골다공증 치료 남성의 골다공증 치료	1주 1회 1병(알렌드론산 으로서 70mg), 아침에 음식물, 음료수 또는 타 약물 섭취 최소한 30분전에 충분한 양의 물과 함께 복용. 최소 110ml 이상의 물을 이어서 복용
DTRAU	트라우밀정	원외 전용	arnica tinc D2 15mg calendulatin D215mg hamamelistinc D115mg millefolium tinc D315mg belladonna tinc D275mg 외	수술 후 사지의 유연부 부종(부기) 및 부기	성인: 1회 1정, 1일 3회.
DIBEOV	비오뷰 프리필드 실린지	신규 원내	brolicizumab (숙주 : E. coli BL21(DE3), 벡터 : pGMP ESBA1008) 19.8mg /0.165mL	신생혈관성 연령관련 황반변성의 치료	자격을 갖춘 의사에 의해 유리체내 주사로 투여, 1개의 프리필드실린지는 한쪽 눈의 치료를 위해서만 사용. 본제 6mg(0.05 mL), 첫 3회 투여 시 4주마다, 이후 12주마다 한 번씩 투여.
DUOSR10	유로시트라 케이 서방정	원내 전환	potassium citrate 1080mg(K+으로서 10mEq)	칼슘 결석이 있는 신 세뇨관 산증, 저구연산 염뇨 성 수산 칼슘 신결석증, 요산결석증	1회 potassium citrate 10mEq 1일 3 회 식사 중 경구투여
DH-DIP6	디페렐린 SR 22.5mg	용량 추가 원내	triptorelin pamoate 31mg (22.5mg as triptorelin)	호르몬 의존성 국소 진행성 또는 전이성 전 립선암 중추성성조숙증	1바이알을 6개월(24주)에 한 번씩 단 회 근육 내 주사
DNAAP1	뉴아미노펜 프리믹스주 0.5g	제조사추가 원내	acetaminophen 0.5g/50ml	통증이나 고열로 인하여 신속하게 정맥 투여 할 필요가 있거나 다른 경로로 투여할 수 없 는 경우의 중등도 통증 또는 발열의 단기간 치료	
DJOMEIY	조메드론주 5mg/100ml	제조사 추가 원내	zoledronic acid monohydrate 5.33mg/100mL (5mg as zoledronic acid anhydride)	골다공증의 치료 1년 1회 본제 5mg 15분 이상 점적 정주	골다공증의 치료: 1년 1회 본제 5mg 15분 이상 점적 정주. 폐경 후 여성의 골다공증 예방. 관장용량: 2년 1회 본제 5mg 15분 이상 점적 정주.
DCEL100T	셀코정 100mg	신규 원내외	celecoxib 100mg	1. 골관절염 또는 류마티스 관절염 2. 강직척추염 3. 성인의 급성 통증	1. 골관절염 : 200mg, 1일 1회 또는 1회 100mg, 1일 2회. 2. 류마티스성 관절염 : 1회 100mg 또는 200mg, 1일 2회.
DCEL200T	셀코정 200mg	신규 원내외	celecoxib 200mg		
DSP-MSZ500	아사콜좌약 500mg	원내 전환	mesalazine 500mg	경증 및 중등증의 궤양성 대장염 (특히 항문 에서 20cm까지 발병하는 직장염, 원위 직장 S상 결장염)의 급성 발작 치료 및 재발예방.	성인 1개(500mg) 1일 3회 직장 내 삽입. 장기간 유지요법 및 재발 예방: 성 인 1회 1개(500mg) 1일 2회 직장 내 삽입.
DUDIS	유디스캡슐	신규 원외 전용	biphenyl-dimethyl- dicarboxylate 12.5mg ursodeoxycholic acid 50mg	지속적으로 SGPT 상승되어 있는 만성 지속 성 간염.	성인 1회 1캡슐, 1일 3회

코드	약품명(제약)	구분	성분	효능	용법
DI-TREL3	트렐리지 엘립타	신규 원내외	fluticasone furoate micronized 100 μ g umeclidiniumbr omide micronized74.2 μ g vilantero trifenatate micronized40 μ g	성인의 지속성 베타2-효능 약과 흡입용 코르티코스테로이드 복합요법 또는 지 속성 베타2-효능 약과 지속성 무스카린 수용체 길항제 복합 요법으로 적절히 조 절되지 않는 중등도 및 중증의 만성 폐 쇄성 폐 질환의 유지요법	성인: 1일 1회, 같은 시간에 1번 흡입
DI-ENER80	에너지어흡입용캡슐 150/50/80	신규 원내외	indacaterol+ glycopyrronium+ mometasone furoate	지속성 베타2 효능약과 흡입 코르티코스테로이드제의 병용 유지 요 법으로 적절히 조절 되지 않는 성인 천 식 환자의 1일 1회 천식 유지 치료	1일 1회 본제 150/50/80mcg 또는 150/50/160mcg 용량 1캡슐 흡입. 매일 규칙적으로 사용, 증상이 없을 때도 지속적으로 사용. 최대 1일 1회 본제 150/50/160mcg.
DI-ENER160	에너지어흡입용캡슐 150/50/160				
DCAMEN5	카멘정 5mg	신규 원외 전용	carbimazole	갑상샘 기능 항진증, 갑상샘 기능 항진 증에서의 갑상샘 절제술 전처치, 방사성 요오드 요법의 전처치 및 병용요법	초기 1일 20-60mg, 갑상샘 기능 정상이 될 때까지 지속, 유지 1일 5-15mg, 최소 6-18개월 지속.
DCAMEN10	카멘정 10mg				
DAKA30-10	아카브정 30/10	신규 원내외	fimasartan potassium+ atorvastatin	본제는 피마사르탄과 아토르바스타틴을 동시에 투여 하여야 하는 환자에 사용. 피마사르탄본태성고혈압. 아토르바스타틴 갈슘·고지혈증.	성인, 1일 1회 1정, 식사와 관계 없이 복용가능, 매일 같은 시간에 복용 권장.
DAKA60-10	아카브정 60/10				
DLIVAZ2-10	리바로젯정 2/10mg	신규 원내외	pitavastatincalcium+ezetimibe	원발성 고콜레스테롤 혈증 (이형접합 가 족형 및 비가족형) 또는 혼합형 이상지 질혈증의 상승된 총 콜레스테롤을 감소 시키고, HDL-콜레스테롤을 증가시키기 위한 식이요법의 보조제로서 투여.	성인: 식사와 관계없이 1일 1회 투 여. 권장 초회 용량: 1일 1회 2/10mg, 필 요 시 1일 최대 4/10mg 까지 증량 가능.
DLIVAZ4-10	리바로젯정 4/10mg				
DOX3	옥시크로린정 300mg	용량 추가 원내외	hydroxychloroquine sulfate300mg	류마티스관절염, 유년성 류마티스 관절 염, 원판성 및 전신 홍반루푸스, 광과민 성 피부질환, 말라리아 예방 및 치료	200-400mg/day, 400mg 투여시 분복
DATOVZ10-10	아토브젯정 10/10	제조사추가 원외 전용	ezetimibe + atorvastatin	원발성 고콜레스테롤 혈증 (이형 접합 가족형 및 비가족형) 또는 혼합형 이상 지질혈증의 상승된 총 콜레스테롤	식사과 관계없이 1일 1회. 원발성 고콜레스테롤혈증: 1일 10/10mg-10/80mg, 초회 용량 1일 10/10mg 또는 10/20mg, 필요시 1 일 10/40mg, 2주 이상의 간격으로 용량 조절
DATOVZ10-20	아토브젯정 10/20				
DATOVZ10-40	아토브젯정 10/40				
DRIRO15	리록시아정 15mg	신규 원내외	rivaroxaban 15mg	비판막성 심방세동 환자의 뇌졸중 및 전신 색전증의 위험 감소 심재성 정맥 혈전증 및 폐색전증의 치료	10mg은 식사과 상관없이, 15mg및20mg은 식사와 함께투여
DRIRO20	리록시아정 20mg				

코드	약품명(제약)	구분	성분	효능	용법
DAMOXQ1	아모잘탄 엑스큐정 5/50/5/10	신규 원외 전용	amlodipinebesylate+ losartanpotassium+ rosuvastatin+ ezetimibe	고혈압·이상지질혈증 치료 목적으로, 본제 주성분 중 2종 이상 투여하고 있는 환자에서 추가 조절이 필요한 경우 본제 사용	성인 1일 1회 1정, 식사와 무관하게 복용. 가능한 매일 같은 시간 복용 권장.
DAMOXQ2	아모잘탄 엑스큐정 5/50/10/10				
DAMOXQ3	아모잘탄 엑스큐정 5/50/20/10				
DAMOXQ4	아모잘탄 엑스큐정 5/100/5/10				
DAMOXQ5	아모잘탄 엑스큐정 5/100/10/10				
DAMOXQ6	아모잘탄 엑스큐정 5/100/20/10				
DW-ZEN02	제노세프주 2g	신규 원내	cefazedone sodium 2g	요로감염증, 담관염, 자궁내감염, 자궁부속 기염 등 부인과 감염증, 피부 및 연조직 감염 증, 골 및 관절감염증, 외과의 감염 예방 및 잠재 감염 치료.	성인: 그람양성균 감염: 1일 1-2g, 2-3회 분할 정주,
DC-LECLA	렉라자	신규 원내외	lazertinib mesylate 80mg	이전에 EGFR-TKI 로 치료받은 적이 있는 EGFR T790M 변이 양성 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 치료	권장 용량: 1일 1회 240mg(80mg, 3정) 매일 일정한 시간에 식사와 관계없 이 복용
DC-ONBE1	온베브지주 100mg/4ml	신규 원내	bevacizumab	전이성 직결장암, 전이성 유방암, 비폐소폐 암, 진행성 또는 전이성 신세포암 상피성 난 소암, 난관암 또는 원발성 복막암, 자궁경부 암	90분간 점적 정맥주입
DC-ONBE4	온베브지주 400mg/16ML				
DC-FVT250F	파슬로덱스 PFS	신규 원내	fulvestrant 50mg/ml	HR-양성및 her-2음성, 폐경기 이후 여성의 진행성 또는 전이성 유방암	
DC-PBC75B	입랜스 캡슐 75mg	신규 원내외	palbociclib	HR-양성및 her-2음성 또는 전이성 유방암 치료에 아로마타제 억제제 또는 풀베스트란트와 병용 여성의 진행성 또는 전이성 유방암	
DC-PBC100	입랜스 캡슐 100mg				
DC-PBC125	입랜스 캡슐 125mg				
DC-IONIV	오니바이드주	신규 원내외	irinotecan Hcl 5mg/ml	젬시타빈을 기반으로 하는 항암요법 이후 진 행된 환자에 대한 플루오로우라실 및 류코보 린과 병용한 전이성 췌장암의 치료	

약제부 게시판

◎ 필요시처방(p.r.n) 약품 목록 ◎

처방에 포함되어야 할 내용 : 투여가 요구되는 환자의 상태(범위), 1회 용량, 투여 경로, 최소 투여 간격, 1일 최대 투여 횟수 등

약품명		코드	투여간격	1일 최대 투여 횟수
1	Fenaca inj	DIFENA1	12hr	1일 2회
2	tridol inj	DTMD100J	12hr	1일 2회
3	Denogan	DPROAAP1GJ	4hr	Max6회
4	20%알부민 100ml (녹십자)	DIALB2	알부민 수치 3.0 이하시 lab 확인 후 투여	
5	0.9% NS 100ml	DINS100	환자마다 용량 및 횟수가 다름	
6	디롤정 400mg	DMDIRO	환자마다 용량 및 횟수가 다름	
7	세토펜이알서방정 650mg	DMSETO	환자마다 용량 및 횟수가 다름	
8	맥시부펜시럽	DDXIPFS	환자마다 용량 및 횟수가 다름	
9	캐롤시럽	DMCARS	환자마다 용량 및 횟수가 다름	
10	macperan	DIMACP	8hr	3
11	Peniramine 4mg 2ml/A	DCPR4J	8hr	3
12	Lasix 20mg/A	DFSM20J	환자마다 용량 및 횟수가 다름	
13	Apidra	DH-AOTJ / DH-AOT 새로 약을 받아야 하는 경우와 있는 약을 사용하는 경우 (재사용, self) 반드시 구분하여 처방!!!!	환자마다 용량 및 횟수가 다름	
14	재사용Apidra(self)			
15	20% dextrose 20ml/A	DJ20DWPJ	환자마다 용량 및 횟수가 다름	
16	50% D/W 100ml/bt	DI50DW1	환자마다 용량 및 횟수가 다름	
17	Novorapid	DH-NRFP / DH-NRF 새로 약을 받아야 하는 경우와 있는 약을 사용하는 경우 (재사용, self) 반드시 구분하여 처방!!!!	환자마다 용량 및 횟수가 다름	
18	재사용Novorapid(self)			
19	Fotagel 20ml/PO	DSMTP	8hr	3
20	0.9% NS 50ml	DINS50-C	환자마다 용량 및 횟수가 다름	
21	Esomach 40mg/V	DIESOMK	12hr	2
22	Yal soln 67.5ml/BT	DYALENE	환자마다 용량 및 횟수가 다름	
23	뉴아미노펜 프리믹스주 0.5g 50ml	*12월 1일부터 사용 (신약)	최소4시간	60mg/kg 또는 2g 미만사용
24	keromin	DIKERO	6시간간격	3번
25	acetphen premix 1g 100ml	DIAAPB2	6시간간격	4번

- 2021년 11월 15일 기준



의약정보

조선대학교병원 의약정보지 2021. 11

PHARMACY NEWSLETTER OF THE CHOSUN UNIVERSITY HOSPITAL

조선대학교병원 약제부 의약정보실

발행인 : 장혜영

편집위원 : 박선희, 김경혜