



의약정보

2022. 12
Vol.26 No.4

◎ 2022년 3차 약사위원회 통과 약물 ◎

코드	약품명	구분	성분	효능	용법	비고
DDKBP-F30 DDKBP-F60	듀카브 플러스 정 30/5/12.5mg 60/5/12.5mg [보령]	신규 원내외	fimasartan/ amlodipine/ hydrochlorothiazide 30/5/12.5mg 60/5/12.5mg	피마사르탄 칼슘과 아미로디핀의 복합 요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압	1일 1회 1정, 식사와 관계없이 복용가능, 매 일 같은 시간(예 : 아침)에 복용 권장. 최대 투여용량은 60/10/25mg	
DRAMP1G DRAMP100G	람노스 산 1g, 100g [한화]	대체 원내외	Lactobacillus casei variety rhamnosus 2×10 ⁸ as living germs 250mg/g	장내균총의 정상화에 의한 정장 및 설 사증상의 개선.	성인: 1일 2g~8g 경구투여. 2세 이상 소아: 1일 1g~4g 1회 투여용량을 식간에 음료 또는 우유와 함께 복용.	람노스 과립 100g 대체
DLIMD	리비디 캡슐 [삼일]	신규 원내외	biphenyl-dimethyl- dicarboxylate 12.5mg/ ursodeoxycholic acid 50mg	지속적으로 SGPT 상승되어 있는 만 성 지속성 간염.	보통 성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후 경구 투여.	
DC-VENCL10 DC-VENCL50 DC-VENCL100	벤클렉스타 정 10mg 50mg 100mg [한국에브비]	신규 원내외	venetoclax 10mg, 50mg, 100mg	1. 만성 림프구성 백혈병: 이전에 치료 받은 적이 없는 성인 환자에서 오비 누투주마과의 병용 요법/ 이전에 치 료를 받은 성인 환자에서 리툭시매판 과의 병용 요법/ 화학면역요법 및 B 세포 수용체 경로 억제제에 재발 또 는 불응성 단독 요법 2. 급성 골수성 백혈병: 만75세 이상, 또는 집중유도 화학요법에 적합하 지 않은 동반질환 있는 새로 진단 된 성인 환자에서 아자시티딘 또는 데시타빈과의 병용요법	1일 1회, 동일한 시간에 식사 및 물과 함께 복용. 씹거나, 으깨거나, 조각내지 않고 통째로 삼 켜 복용	
DVFOR-V80 DVFOR-V160	브이포지알 정 5/80/10mg 5/160/10mg [대웅바이오]	신규 원내외	amlodipine/ valsartan/rosuvastatin 5/80/10mg 5/160/10mg	아미로디핀/발사르탄 복합제와 로수바 스타틴을 동시에 투여하여야 하는 환 자에만 사용.	1일 1회 1정을 물과 함께 복용한다. 가능하면 매일 같은 시간(예 : 아침 식전)에 복용하는 것이 권장된다.	
DMSETOS	세토펜 현탁액 [삼아]	신규 원내외	acetaminophen 32mg/mL	감기로 인한 발열 및 통증, 두통, 신경 통, 근육통, 월경통, 염좌통, 치통, 관 절통, 류마티양 통증.	만 12세 이하: 1회 10~15mg/kg, 4~6시간 간 격 복용, 1일 최대 75mg/kg. 연령과 몸무게에 따라 용량 조절.	
DMAXAT150	엑사티드 캡슐 [서울]	원내 전환 원내외	nizatidine 150mg	활동성 위 · 십이지장 궤양 치료 및 십 이지장 궤양 재발방지, 내시경상으로 진단된 미란성 및 궤양성 식도염, 위 식도 역류질환에 기인한 가슴쓰림 증 상의 치료, 급성위염, 만성위염의 급 성 악화기의 위점막병변의 개선.	활동성 위 · 십이지장궤양: 1일 1회(취침시) 300mg 또는 1회 150mg 1일 2회. 십이지장궤양 재발방지: 1일 1회(취침시) 150mg. 위식도역류질환: 1회 150mg 1일 2회. 위점막병변 개선: 1회 150mg 1일 2회.	
DESODU20 DESODU40	에소두오 정 20/800mg 40/800mg [종근당]	대체 원내외	esomeprazole magnesium trihydrate/ sodium bicarbonate 20/800mg 40/800mg	위식도 역류질환 - 미란성 역류식도염의 치료 - 식도염 재발방지를 위한 장기간 유 지요법 - 식도염이 없는 위식도 역류질환의 증상 치료요법	적어도 식사 1시간 전 공복에 복용. 반 컵 이상의 물과 함께 그대로 삼켜 복용, 씹거나 부수어서는 안됨.	가나플렉스 정(원외) 대체
DEPGL10 DMJARD25	자디앙 정 10mg 25mg [베링거인겔하임]	원내 전환 원내외	empagliflozin 10mg, 25mg	1. 제2형 당뇨병: 제2형 당뇨병의 혈당 조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여. 2. 만성 심부전: 만성 심부전(NYHA class II-IV) 에서 심혈관질환으로 인한 사망 및 심부전으로 인한 입 원 위험성 감소	식사와 관계없이 투여 가능. 1. 제2형 당뇨병: 1일 1회 10mg, 최대용량 1일 1회 25mg 2. 만성 심부전: 1일 1회 10mg	
DGEMG50	제미글로 정 50mg [엘지화학]	원내 전환 원내외	gemigliptin tartaric acid 1.5 hydrate 68.9mg (50mg as gemigliptin)	제2형 당뇨병환자의 혈당조절을 향상 시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여.	단독요법 또는 병용요법 시 1일 1회 50mg. 1일 최대 50mg, 식사와 관계없이 투여.	

코드	약품명	구분	성분	효능	용법	비고
DCANA16/5/10 DCANA16/5/20	칸타벨 에이징 16/5/10mg 16/5/20mg [종근당]	신규 원내외	candesartan cilexetil/ amlodipine besylate/ atorvastatin calcium 16/5/10mg, 16/5/20mg	칸데사르탄실렉세틸/암로디핀 복합제 와 아토르바스타틴을 동시에 투여하 여야 하는 환자에만 사용.	성인: 1일 1회 1정. 식사와 관계 없이 물과 함 께 복용. 가능하면 매일 같은 시간(예:아침) 복용.	
MTACT2	타크로벨 정 2mg [종근당]	제형 추가 원내외	tacrolimus hydrate 2.04mg (2mg as tacrolimus)	간·신이식에서의 거부반응의 억제, 골수이식 후에 따르는 조직이식 거부 반응과 이식편-숙주반응 질환, 만성 류마티스 관절염, 루푸스신염, 중증근무력증	신/간 이식: 초기 1회 성인 0.05-0.10mg/ kg(소아 0.15mg/kg) 1일 2회. 골수이식: 이식 1일전부터 1회 0.06mg/kg 1 일 2회, 이후 서서히 감량. 이식편대숙주병 발현 후의 경우 1회 0.15mg/kg, 1일 2회.	
DIMAXI	맥시제시 주 [경보]	신규 원내	1mL 중 acetaminophen 10 mg, ibuprofen sodium dihydrate 3.85mg(3mg as ibuprofen), 100ml	성인에서 통증으로 인하여 신속하게 정맥 투여할 필요가 있거나 타 경로로 투여할 수 없는 경우: 중등도-중증의 통증(특히 수술 후)의 단기간 치료	1바이알(100mL, 아세트아미노펜/이부프로 펜으로서 1000mg/300mg) 매 6시간 간격 정맥내 주입 투여. 1일 최대 투여량 아세트아미노펜으로서 4 g. 15분간 정맥내 주입으로 투여	차광보관
DBREATH2	브레스온 주 2mL [보령]	제조사 추가 원내	sugammadex sodium 108.8mg/mL (100mg as sugammadex)	로쿠로늄 또는 베쿠로늄에 의해 유도 된 신경근 차단 역전	1. 일반적인 역전: 연속반응수가 1-2회 나타 날 경우 4mg/kg. 유도된 신경근 차단 상태 로부터 T2가 다시 나타나는 자발적 회복 에 접어들었을 때 2mg/kg 2. 로쿠로늄 투여 후 신속한 역전: 3분 후 16 mg/kg	차광보관
DSIMPOA	심퍼니 오토 인젝터 주 0.5mL [한국안센]	대체 원내	golimumab (유전자재조합, 숙주 : Sp2/O-Ag14, 벡터 : p1860, p1865) 50mg/0.5 mL	류마티스 관절염, 건선성 관절염, 축 성 척추관절염, 궤양성 대장염	성인(만 18세 이상) 피하주사 류마티스 관절염, 건선성 관절염, 축성 척추 관절염: 월 1회 50mg, 궤양성 대장염: 첫 주 200mg, 2주 뒤 100mg, 이후 4주에 한번 100mg	심퍼니 프리필드 시린지 주 50mg 대체 냉장차광
DADACEPFS DADACEPEN	아달로제 PFS, PEN 40mg [유한]	제조사 추가 원내	adalimumab 40mg/0.8mL	류마티스 관절염, 건선성 관절염, 축 성 척추관절염, 크론병, 건선, 궤양성 대장염, 베체트 장염, 화농성 한선염, 포도막염	류마티스 관절염, 건선성 관절염: 40mg을 2 주 1회 성인 크론병: 첫 주에 80mg을 투여, 2주 후 40mg 피하주사 건선: 80mg, 1주 후 40mg 격주	냉장차광
DAM-AMINO	아미노플라즈마 5%E 주 [비브라운코리아]	신규 원내	5% 단백아미노산 250ml	2세이상 소아-성인: 경구 또는 위장 관 영양공급이 불가능 또는 불충분하 거나 금기인 환자들에게 아미노산 및 소량의 전해질 보급	14세 이상: 본제 20-40mL/kg/day 정주, 1 일 최대 40mL/kg/day. 2-14세: 1일 투여량 30mL/kg/day(2-5세) 또는 20mL/kg/day(5-14세) 정주. 최대 주입속도 2mL/kg/h.	차광보관
DI-ATECT1 DI-ATECT2 DI-ATECT3	어택트라 흡입용캡슐 150/80mcg 150/160mcg 150/320mcg [노바티스]	신규 원내외	indacaterol acetate (indacaterol)/ mometasone furoate 150/80mcg 150/160mcg 150/320mcg	지속성 베타2 효능약과 흡입 코르티 코스테로이드제의 병용 요법이 적절 하다고 판단되는 만12세 이상의 1일 1 회 천식 유지 치료	만 12세 이상 1캡슐을 1일 1회 침부된 흡입기 에 장착하여 입을 통해 흡입, 흡입용으로만 사용, 캡슐을 삼켜서는 안됨. 매일 동일 시간대에 흡입, 흡입 후 물로 입 을 행구고 행구 물은 삼키지 않음.	차광보관 습기주의
DAM-IWINP4	위너프 페리 주 241mL [JW중외]	용량 추가 원내	포도당/아미노산/지방 241ml	경구 또는 위장관 영양공급이 불가능, 불충분하거나 제한되어 경정맥 영양 공급을 실시해야 하는 환자들에게 수 분, 전해질, 아미노산, 칼로리, 필수지 방산 및 오메가-3 지방산의 보급.	용량: 1일 20-40mL/kg은 질소 0.10- 0.20g/kg과 총 열량 14-28kcal/kg에 해당. 1일 최대 40mL/kg 권장. 투여속도: 3.0mL/kg/hr, 14-24시간.	실온보관
DW-ZERB	저박사 주 [엠에스디]	신규 원내	2792mg 중 ceftolozane sulfate 1147mg (1000mg as ceftolozane) tazobactam sodium 537mg (500mg as tazobactam)	복합성 복강내 감염(이 약과 메트로니 다졸 병용 투여) 복합성 요로 감염(신 우신염 포함) 원내 감염 폐렴(인공호 흡기 관련 폐렴 포함)	CrCL>50mL/min인 18세 이상. 복합성 복강내 감염: 1.5g (세프트로잔 1g/타 조박탐 0.5g), 8시간마다, 4-14 일간. 메트 로니다졸 500mg 정주병용. 복합성 요로감염: 1.5g 8시간마다, 7일간 원내 감염 폐렴: 본제 3g 8시간마다, 8-14 일간	제한항생제 냉장차광
DC-ZOMEF	조메본 프리필드주사 [동국]	대체 원내	zoledronic acid monohydrate 4.26mg	악성 종양으로 인한 과칼슘혈증, 다발성 골수종 및 고형암의 골전이의 치료에 표준항암요법과 연계하여 처 방. 전립선암의 경우는 최소 1회 이상 호 르몬 요법 후 병이 진행된 경우 사용.	1. 악성 종양으로 인한 고칼슘혈증: 4mg을 100mL의 0.9% NaCl 또는 5% DW으로 희석하여 15분간 점적정주. 2. 성인 및 노인, 다발성 골수종 및 고형암의 골전이의 추천 용량은 매3-4주마다 4mg 을 적어도 15분 이상 점적정주	조메타 레디 주사액 대체
DCORE-A	코어톡스 주 [메디톡스]	대체 원내	Clostridium botulinum A toxin (150kDa) (Hall균주) 100unit	눈썹주름근 그리고/또는 눈살근 활동 과 관련된 중등증-중증의 심한 미간 주름의 일시적 개선(만20-만65세).	미간주름: 각 눈썹주름근의 두 곳과 눈살근 의 한 곳 총 5개 부위에 0.1 mL씩 총 200을 주사.	보톡스 주 50unit 대체 냉장보관
DCLASCAN10 DCLASCAN20	클라리스칸 프리필드시린지 주 10ml 20ml [지이헬스케어 에이에스]	제조사 추가 원내	meglumine gadoterate solution 67.58g/100mL (37.69g as meglumine gadoterate)	뇌신경계 및 척추의 MRI 조영제, 체부(MR혈관조영 포함)의 MRI 조영 제.	성인 및 소아: 0.1mmol/kg (0.2mL/kg) 정주. 성인의 연수막 종양진단 및 단독전이 확 인 등 예외시 0.2mmol/kg(0.4mL/kg)를 추 가 정주 및 혈관조영에서 필요시 0.1mmol/ kg(0.2mL/kg) 추가	
DN-FENTAP12 DN-FENTAP25	펜타듀르 패취 12mcg/h 25mcg/h [Lavipharm]	제조사 추가 원내	fentanyl 1.375mg/매(5cm) fentanyl 2.75mg/매(10cm)	장시간 지속적인 마약성 진통제 투여 를 필요로 하는 만성 통증의 완화.	개별적 용량 설정해야 하며 투여 후에는 일 정 간격으로 반응 평가 필요. 가슴이나 팔에 부착, 1매를 3일간 사용가능.	마약

코드	약품명	구분	성분	효능	용법	비고
DI-MUC010	보령 뮤코미스트 액 10% [보령]	제형 추가 원내외	acetylcysteine 10g/100mL	기관지천식, 만성기관지염, 기관지 확장증, 폐결핵, 폐기종, 상기도염(인·후두염), 폐화농증, 폐렴, 낭성섬유증, 수술후 폐합병증에서의 객담배출곤란, 기관지조영, 기관지경 검사, 폐암 세포진, 기관절개술 전·후 처치.	안면마스크, 마우스피스, 기관누공형성술 이용 분무요법: 1-10mL, 2-6시간마다. 추천용량 3-5mL, 1일 3-4회. 진단용 기관지 조영시: 기관지 조영 전 1-2mL, 2-3회 분무용법 또는 기관지내 주입법에 의해 투여	차광보관
DA-INCAG6	인카인 겔 6mL [파슨]	대체 원내	100mL 중 chlorhexidine gluconate solution 0.26g, lidocaine hydrochloride monohydrate 2.09g	다음 시술시 표면마취, 소독, 윤활작용: 카테터 삽입, 요도(남성·여성)내 수술, 각종 내시경 검사, 삽관, 시술로 인한 직장과 결장에서의 손상 예방.	카테터삽입: 6mL또는 11mL주입. 방광경검사: 11mL, 필요시 6mL 또는 11mL추가 주입. 요도합착(요도구절개술): 11mL, 필요시 6mL 또는 11mL추가 주입. 소독: 6mL 또는 11mL를 점막에 골고루 바르거나 주입.	카티젤 겔 8.5g, 12.5g 대체
DN-PECNA100 DN-PECNA400	팩펜트 나잘 스프레이 100µg 400µg [메나리니]	대체 원내	fentanyl citrate 1.57mg/mL (1mg as fentanyl), 1.55mL 6.28mg/mL (4mg as fentanyl), 1.55mL	18세 이상: 현재 지속성통증에 대한 아편양 제제 약물 치료를 받고 있으며, 이에 대한 내약성을 가진 암 환자의 돌발성 통증.	1. 초회 용량: 100µg (1회 분무) 또 다른 돌발성 통증에 대해 최소 4시간 간격으로 투여. 2. 용량 적정: 효과 부족 시 다음 돌발성 통증에 대해 200µg 분무(각 비공 당 100µg씩 1회) 불충분 시 400µg/spray 1회 분무 또는 불충분 시 800 µg 분무(각 비공 당 400µg씩 1회)로 증량 가능. 최대 1일 4회	인스타닐 나잘 스프레이 마약 차광보관
DMGABA25	가바뉴로 캡슐 25mg [한림]	제조사 추가 원외	pregabalin 25mg	성인에서 말초와 중추 신경병증성 통증의 치료. 뇌전증: 성인에서 이차적 전신증상을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작의 보조제, 섬유근육통의 치료.	1. 신경병증성 통증 및 뇌전증: 시작용량 1일 150mg 투여, 3-7일 후 300mg까지 증량가능. 이후 1주일 간격으로 1일 최대 600mg. 2. 섬유근육통: 1일 150mg, 1주일 이내 1일 300mg까지. 추가로 1일 450mg까지 증량가능	
DROZE-R5 DROZE-R10	로제텔 정 40/5/10mg 40/10/10mg [녹십자]	신규 원외	telmisartan/ rosuvastatin/ ezetimibe 40/5/10mg 40/10/10mg	두 약물(텔미사르탄과 로수바스타틴/에제티미브)을 동시에 투여하여야 하는 환자에만 사용.	성인: 1일 1회 1정, 식사와 관계없이 복용. 가능한 매일 같은 시간에 복용 권장	
DW-VIDOXY	바이독시 정 [메디카코리아]	제조사 추가 원외	doxycycline hydrate 100mg	발진티푸스, 발진열, 편도염, 인두염, 기관지염, 기관지확장증(감염 시), 폐렴, 폐농양, 유선염, 림프절염, 골수염, 성홍열, 중이염, 부비동염, 임질, 여드름 등	성인: 초회 1회 100mg, 12시간마다, 유지 1일 100mg 1-2회 분복. 12세 이상(체중 45kg 이하): 초회 4mg/kg, 1일 2회 분복, 유지 1일 2mg/kg, 1-2회 분복.	차광보관
DCITR-ODT	씨트렐린 구강붕해정 5mg [에이치엘비]	신규 원외	Taltirelin hydrate 5mg	척수 소뇌 변성증에 의한 운동 실조의 개선	1회 5mg을 1일 2회(아침/저녁) 식후에 경구 투여. 연령, 증상에 따라 적절히 증감	
DWAKIX5 DWAKIX20	와키스 필름코팅정 5mg 20mg [MitsubishiTanabe]	신규 원외	pitolisant hydrochloride 5mg, 20mg	탈력발작을 동반하거나 동반하지 않는 성인의 기면증	성인: 아침 식사와 함께 복용. 1일 최대 40mg. 1일 5mg에서 40mg의 범위 내에서 용량 증감	
DUROP75	유로피딜 정 75mg [제뉴파마]	제조사 추가 원외	naftopidil 75mg	전립선 비대증에 의한 배뇨 장애.	성인: 1일 1회 25mg, 불충분한 경우 1-2주간격으로 50-75mg로 점증. 1일 최대 75mg.	차광보관
DKMZ-IDT	크레메진 속봉정 [HKInno.N]	제형 추가 원외	spherical adsorptive carbon 500mg	만성신부전(진행성)에 대한 요독증 증상의 개선 및 투석도입의 지연	성인: 1일 3회, 1회 4정 복용	
DH-PREDA1	프레다 정 1mg [다림바이오텍]	대체 원외	estradiol hemihydrate 1.03mg (1mg as estradiol)	에스트로겐 결핍 증상(갱년기장애), 폐경 후 골다공증의 예방.	1일 1회 1 또는 2mg을 중단없이 복용. 자궁 적출술 받았거나 폐경 여성은 편리한 날 어느 때라도 시작 가능. 정상적인 월경이 있는 경우 월경주기 제 5일부터 투여	프레미나 정 0.625mg 대체
DHIPE-P5 DHIPE-P10	하이페질 산 5mg 10mg [현대]	제형 추가 원외	donepezil hydrochloride hydrate 5.22mg, 10.44mg (5mg, 10mg as donepezil HCl)	알츠하이머형 치매증상 치료	물과 함께 복용하고 1포를 나누어 복용하지 않음. 성인: 1일 1회 5mg 취침 전 투여. 4-6주 후 10mg로 증량가능. 저체중 85세 이상 여성 환자: 1일 최대 5mg.	차광보관
DD-DONE1 DD-DONE2	도네리온 패취 87.5mg 175mg [셀트리온]	신규 원외	donepezil 87.5mg 175mg	알츠하이머형 치매증상의 치료	본제 1매(87.5mg/25cm ²), 1주 2회(3일과 4일 간격을 교대로) 취침 전 등에 부착하여 투여시작. 4-6주간은 1매(87.5mg/25cm ²) 투여. 이상반응 모니터링과 임상적 반응 평가 후 1매(175mg/50cm ²), 1주 2회로 증량 가능	
DD-ECZ8	주블리아 외용액 8mL [동아에스티]	용량 추가 원외	efinaconazole 100mg/g	피부사상균에 의한 조갑(손발톱)진균증	1일 1회 감염된 손발톱에 도포. 본제 바르기 전 손발톱 깨끗이 씻고 완전히 건조 후 브러시 이용해 바름. 바른 후 완전히 건조. 손발톱 및 인접한 피부에만 사용	차광보관

약제부 게시판

◎ 생산중단/일시품절 ◎

약품명	사유	입고예정 및 대체약 안내
8월		
탄툼 베르데 네블라이저	일시품절	재입고 예정일 9월 초 이전에 원내재고소진 예상시 재공지 예정
세토펜 이알 서방정	일시품절	원내 재고 소진 후 코드 불용 예정. 대체약 써스펜 8시간 이알 서방정 소량 입고되어 사용중
캐롤 시럽	일시품절	재공급일 이전 원내재고 소진시 코드 불용예정. 대체약: 어린이 부루펜 시럽
알콘 아트로핀 1% 점안제	일시품절	원내재고 소진되어 불용. 동일함량 대체약은 없음
타이로젠 주	일시품절	원내재고 소진 후 코드 불용예정. 재공급예정일: 9월 16일
조스타박스 주	일시품절	원내재고 소진 후 코드 불용예정. 재공급예정일: 9월 초
9월		
아다셀 주	일시품절	원내재고 소진 후 코드 불용예정. 재공급 예정: 10월. 녹십자 티디백신 프리필드시린지주도 공급 불안정
렉크린 액	일시품절	원내재고 소진되어 불용됨. 동일 성분 대체약은 없음. 동일 효능군 대체약: 그린 관장약 30ml
알 액	생산중단	원내재고 소진되어 불용됨. 동일 성분 대체약은 없음. 동일효능군 대체약: 그린 관장약 30ml
엘시토닌 주 20unit/ml	생산중단	원내재고 소진 후 코드 불용예정. 대체약은 해당과 논의예정
파사렉트 연고	장기품절	재공급예정 11월이며 원내재고는 있으나 원외약국 재고 없음
실로덱스 점막 현탁액	일시품절	원내재고 소진 후 코드 불용예정. 재공급예정일: 22년 9월말
펜탁심 주	일시품절	원내재고 소진 후 코드 불용예정. 질병관리본부 접종 가이드라인 DTaP 백신 기초접종인 테트라심도 공급 안됨
가다실 9 프리필드시린지	일시품절	현재 원내 사용 가능 재고는 9개이며, 재공급예정일: 9월 말
데파코트 스프링클 캡슐	일시품절	원내재고소진 후 코드 불용예정, 재공급 예정일: 23년 1월
알레그라 디 정	일시품절	재공급일정 지연. 원내재고는 소진되어 불용됨. 원내 동일효능군: 알레그라 정 120mg, 슈다페드 정 60mg
디롤 정 400mg	생산중단	원내재고 소진되어 불용됨. 대체약: 멕시부 정 400mg
멕시부펜 이알 정 300mg	품절해제	일부 공급되어 처방 가능함
도란사민 캡슐	품절해제	수급불안정으로 품절이었다가 재공급되어 처방 가능함
젤로빅 정 500mg	일시품절	재고 소진 후 코드불용예정. 재공급 예정일: 22년 10월 중순. 대체가능약: 젤로다 정 500mg
파세틴 주 1g	일시품절	공급예정일인 10월 20일 이전 재고소진 예상되면 재공지
카스카 현탁액	일시품절	공급불안정으로 코드 불용됨.
카로스 현탁액	품절해제	수급불안정으로 품절이었다가 재공급되어 처방 가능함

약품명	사유	입고예정 및 대체약 안내
데카렙텔 데포 주	일시품절	원내재고소진 후 코드 불용예정. 재공급 22년 11월말 예정
펜톨민 주사 10mg	생산중단	원내 보유 사용기한 22년 10월 12일 이후 코드 불용예정
아지타스 건조시럽 22.5ml	일시품절	원내재고소진되어 코드불용 대체약: 대웅 아지트로마 이신 건조시럽
10월		
디솔린 주	품절해제	수급불안정으로 품절이었다가 재공급되어 처방 가능함
아토크 정 20, 40mcg	생산중단	40mcg 원내재고 소진되어 코드불용. 20mcg은 재고 소진 후 코드 불용예정 아토크 건조시럽은 처방가능
자이박스 주 2mg/ml	품절해제	처방가능하며 대체약이었던 씨네졸리드 주 코드불용됨
멕시부펜 시럽 500ml	장기품절	원내재고(500ml 1병) 소진 후 코드 불용예정
로프민 캡슐	일시품절	원내재고소진되어 코드불용 대체약: 삼남 로페라마이드 캡슐
다이놀 정 200mg	공급중단	원내재고소진시 코드 불용예정
마도파 정 125, 250	생산중단	원내코드 불용. 대체약: 명도파 정 25/100mg, 50/200mg
대원 황산아트로핀 주사액	공급중단	재고소진후 코드 불용예정. 대체약: 대한 아트로핀황산염 주사액
타고시드 주 200mg	품절해제	일시품절 해제되어 처방가능함
케이콘틴 서방정	일시품절	원내재고소진후 코드 불용예정 재공급 일정 미정 대체약은 없음
다이놀 정 200mg	공급중단	원내재고소진되어 코드 불용되었으며 동일성분 대체약은 없음
베네프 정	품절해제	재공급되어 처방 가능함
이수푸렐 주 1mL	생산중단	재고 소진되어 코드 불용. 대체약: 의태 프로테르놀렐 주 0.2mg
11월		
타이레놀 정 160mg	허가취하	코드불용. 대체약: 어린이용 타스펜 정 160mg
클래리시드 정주 500mg	일시품절	재공급예정인 11월 중순 전 재고 소진시 코드 불용예정 동일성분 복용약: 클래리시드 필름코팅정 500mg. 클래리시드 필름코팅정 250mg (동일성분 주사약은 없음)
엘라좁 점막 현탁액	일시품절	재공급예정인 11월 28일 이전 재고 소진이 예상되면 해당과 상의 예정
대만 99.5% 무수에탄올 주	일시품절	희귀의약품센터 재공급일 미공지로 해당과 상의 후 대체약 공지
노디트로핀 노디플렉스 주	일시품절	원내재고 소진 후 코드 불용예정. 대체약 해당과와 상의 후 공지에정
텔미칸 정 80mg	일시품절	재공급 예정인 12월 이전 재고 소진시 코드 불용예정 대체약: 텔미칸 정 40mg, 텔미트렌 정 20mg
프레미나 정 0.3mg (원외)	생산중단	원외재고 소진되어 코드 불용. 대체약: 프레다 정 1mg 원외 처방가능(성분 다름)



의약정보

조선대학교병원 의약정보지 2022. 12

PHARMACY NEWSLETTER OF THE CHOSUN UNIVERSITY HOSPITAL

조선대학교병원 약제부 의약정보실

발행인 : 장혜영

편집위원 : 박선희, 오재기, 김소영