

조선대학교병원 의약정보지

PHARMACY NEWSLETTER OF THE CHOSUN UNIVERSITY HOSPITAL



2023. 2 Vol.27 No.1

◆ 수술 전 중단 약물 ●

성분명	상품명	용량	비고					
	항혈전제	,	•					
	아스피린 프로텍트 정	100mg						
aspirin	아스트릭스 캡슐	100mg						
aspirin +	슈퍼피린캡슐	100mg/75mg	- 7~10일전					
clopidogrel	플라빅스 에이 정(원외)	111mg/75mg	7					
	플래리스 정	75mg						
clopidogrel	플라빅스 정(원외)	75mg	- 5일전					
	E-1 1— O(L-1)	50mg						
	프레탈 정	100mg						
cilostazol		100mg	=					
CIIOSIAZOI	프레탈 서방캡슐	200mg	_ 2–3일전					
	실로스탄 씨알 정	<u> </u>	- 020					
aileate al Lainkas	결도스턴 씨럴 경	200mg	_					
cilostazol+ginkgo leaf dried extract	리넥신 정	100mg/80mg						
	안플라그 정	100mg						
sarpogrelate	안플레이드 SR 정	300mg	1일전					
	사프닐 정(원외)	100mg						
mesoglycan	메소칸 캅셀	50mg	3-4일전					
boroprost	베라스트 정	0.02mg	- 1일전					
beraprost	베라실 정	0.02mg	1일신					
ticlopidine	유유 크리드 정(원외)	250mg						
ticlopidine + ginkgo leaf dried extract	유크리드 정	250mg/80mg	10~14일전					
	-11-101	10mg	70171					
prasugrel	에피언트 정	5mg	- 7일전					
triflusal	디스그렌 캡슐	300mg	7일전					
		60mg	3-5일전					
ticagrelor	브릴린타 정	90mg						
 항응고제								
	쿠파린 정	2mg	5일전 INR≤1.4					
warfarin	제일 와파린 정	5mg	_ 5일전 INR으1.4 확인					
	- 12 0	110mg	2~4일					
dabigatran	프라닥사 캡슐	150mg	(최소 12시간)					
		2,5mg	(1 = 12)					
apixaban	엘리퀴스 정	5mg	1-2일전					
		15mg (원외)	최소 24시간					
a alayyala aya	리니아나 저							
edoxaban	릭시아나 정	30mg						
		60mg						
rivaroxaban		2.5mg (원외)	최소 24시간 (CrCl 15~29인 경우4일)					
	자렐토 정	10mg						
		15mg						
		20mg						
	리록시아 정	15mg						
		120mg						
	경구용 피임제							
drospirenone + ethinyl estradiol	야즈 정(원외)	3/0.02mg	45.14					
levonorgestrel	노레보원 정	1.5mg	─ 4 주 전 					
ulipristal acetate	엘라원 정	30mg						
	생약 제제	1	1					
garlic oil + biphenyl-dimethyl- dicarboxylate	펜넬 캡슐	50/25mg	7일전					

형대	성분명	상품명	용량	비고				
extract 타나단 영 80mg 30시간전 Ginkgot Ginseng 천교산 법설 60mg/100mg 7일전 ibudilast 케타스 합센 10mg 3일전 Imaprost 오필몬 정 5mcg 1~3일전 natronyl 나푸릴 합셀 100mg 7일전 nicergoline 사미온 정 10mg 7일전 pentoxifylline 트렌탈 서방정 400mg 수울 당일 아라까지 지병용 pentoxifylline 트렌탈 서방정 400mg 수울 당일 아라까지 지병용 pentoxifylline 트렌탈 서방정 1033mg/2mg 수울 당일 아라까지 지병용 pentoxifylline 트렌탈 정원외) 1033mg/2mg 수울 당일 아라까지 지병용 에스디올 하프 정(원외) 103,05mg 2mg 4-6주전 라비를 정원외) 25mg 10mg 6주주전 라비를 정원외) 25mg 10mg 20mg 라비를 정원외) 2mg 10mg 3일전 라비를 정원외) 2mg 2mg 라마를 제가 정 100mg 2P 라비를 정원외) 2mg 2mg 라비를 제가 정 10mg 2P	혈류개선제							
8년 전기	ginkgo leaf dried	디니디저	40mg	26117174				
Ibudilast 게타스 컨셀 5mcg 1~3일전 1maprost 2패본 정 5mcg 1~3일전 1maprost 2패본 정 5mcg 1~3일전 1maprost 1m	extract	다다한 경	80mg	30시간선				
Imaprost 오팔본 정 2마단 정 5mcg 1~3일전 Indironyd 나무릴 감설 100mg 7일전 Indiregoline	Ginkgo+ Ginseng	징코산 캡슐	60mg/100mg	7일전				
Imagrost 리미된 정	ibudilast		10mg	3일전				
기타는 성 100mg 7일전 100mg 7일전 100mg 1일전 30mg 1일전 30mg 1일전 30mg 7월호 당일 이침까 지 보용 10mg 30mg 7월호 당일 이침까 지 보용 10mg 1033mg/2mg 10mg 1033mg/2mg 10mg 10mg 1033mg/2mg 10mg 10mg 2mg	limanroet		5mcg	1~3일저				
Protectifoline	штаргозг	리마딘 정	5mcg	1.2055				
Portloxifylline	nafronyl	나푸릴 캅셀	100mg	7일전				
Perloxifylline	niceraoline	 사미오 정	10mg	1인저				
한편에 전체		1-12-0	30mg					
estrogens 한젤릭 정(원외)	pentoxifylline		_					
estrogens								
estrogens								
프로기노바 28 정 1mg				-				
프로기노바 28 정 1mg 2mg 2	estrogens	크리멘 28 성(원외)	<u> </u>					
프레다 정(원외) 1mg 2,5mg 1 ling 2,5mg 1 ling 2,5mg 1 ling 3 (원외) 2,5mg 2,5mg 1 ling 3 (원외) 2,5mg 2 ling 3 (원외) 2 mg 2	· ·	프로기노바 28 정	<u> </u>	_				
tibolone		==U=L T/(OLO)						
### 1000ne ### 1000ne ### 1000ne ### 1000ne ### 1000ne ### 100ne ### 1000ne #### 1000ne ##### 1000ne ##### 1000ne ##################################			-	4 - 6수선				
대한 정(원외) 2mg 기반 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전	tibolone			-				
Bazedoxifene 비비안트 정 20mg 20			_	_				
bazedoxifene 비비안트 정 20mg 유트로게스탄 연질캡슐 100mg 고로베라 정 5mg(원외) 10mg 3일전 raloxifene 레브리스 정 60mg 라본 디 캡슐(원외) 60mg/8mg tamoxifen 눌타덱스 정 10mg 2주전 제트포르민 제제	dienogest		-	_				
Progesterone		,,	_ <u> </u>	-				
Progesterone	bazedoxifene							
Taloxifene 변기 전		유트로게스탄 연질캡슐	-	_				
raloxifene 에비스타 정	progesterone	프로베라 정		2017				
Taloxifene 리보드 기 캡슐(원외) 60mg/8mg tamoxifen 돌바덱스 정 10mg 2주전 메트포르민 제제		에비사다전	-	3일신				
### 10mg 2주전 대한	raloxifene		-	_				
매etformin 비트포르민 제제 500mg 850mg 1000mg 1000mg 1000mg 1000mg 500mg 6291) 24시간 전 복용 중단 metformin 대부 제미메트 서방정 (원외) 25/1000mg (원외) 기가능 제보용 대부용 대부용 대부용 대부용 대부용 대부용 대부용 대부용 대부용 대부	tomoviton			2조저				
metformin 글루파 정	lamoxilem		lollig	272				
metformin		메프포트한 제제	500ma					
metformin		 글르파 저	_ <u> </u>	_				
metrormin 메트그린 에스알 정 500mg 다이아벡스 엑스알 서방정(원외) 1000mg vildagliptin + metformin 가브스메트 정 50/850mg alogliptin + metformin 가브스메트 정 12.5/500mg empagliflozin + metformin 가디앙 듀오 정(원외) 12.5/1000mg empagliflozin + metformin 자디앙 듀오 정(원외) 5/500mg linagliptin + metformin 트라젠타 듀오 정 2.5/850mg dapagliflozin + metformin 직듀오 서방정(원외) 10/1000mg gemigliptin + metformin 제미메트 서방정 25/1000mg gemigliptin + metformin 제미메트 서방정 1/250mg(원외) glimepiride + metformin 아마릴 엠 정 1/250mg(원외) 이마를 메스 서방정(원외) 2/500mg teneligliptin 테벨리아 엠 서방정		2 	_ <u> </u>	-				
다이아벡스 엑스알 서방정(원외) 1000mg 500mg 500m0 4 metformin 가브스메트 정 500mg 500m0 (원외) 24시간 전 복용 중단 12.5/1000mg 12.5/1000mg 12.5/1000mg 7000mg 12.5/1000mg 7000mg 12.5/1000mg 200mg 12.5/1000mg 12.5/1000mg 12.5/1000mg 12.5/1000mg 12.5/1000mg 1000mg 1000mg 1000mg 10000mg 100000mg 10000mg 100000mg 10000mg 100000mg 1000000mg 100000mg 100000mg 100000mg 100000mg 100000mg 100000mg 1000000mg 1000000mg 100000mg 1000000mg 1000000mg 1000000mg 1000000mg 1000000mg 1000000mg 100000mg 1000000mg 1000000mg 1000000mg 10000000000	metformin	메트그리 에人안 저						
Vildagliptin + metformin 가브스메트 정 500mg 50/850mg 50/1000mg (원외) 24시간 전 복용 중단 metformin 비시나 메트 정(원외) 12.5/500mg 12.5/1000mg 10/500mg 10/750mg 10/750mg 10/750mg 10/750mg 10/750mg 10/750mg 10/750mg				-				
vildagliptin + metformin 가브스메트 정 50/850mg 50/1000mg (원외) 24시간 전 복용 중단 alogliptin + metformin 네시나 메트 정(원외) 12.5/500mg 12.5/1000mg 12.5/1000mg 수술 후 신기능 검사 후 재복용 empagliflozin + metformin 자디앙 듀오 정(원외) 2.5/850mg 2.5/1000mg 조 영제 후 복용 중단 하고 48시간 후 신기능검사 후 제무오 서방정(원외) dapagliflozin + metformin 직듀오 서방정(원외) 10/1000mg 10/500mg 조 생기 후 복용 중단 하고 48시간 후 신기능검사 후 재복용 gemigliptin + metformin 제미메트 서방정 25/1000mg (원외) 자보용 glimepiride + metformin 아마릴 엠 정 아마릴—멕스 서방정(원외) 1/250mg(원외) 2/500mg teneligliptin 테벨리아 엠 서방정 10/750mg		다이아벡스 엑스알 서방정(원외)		-				
지(dagliptin + metformin 기보스메트 정 50/1000mg (원외) 24시간 전 복용 중단 12.5/500mg 12.5/1000mg 12.5/1000mg 12.5/1000mg 12.5/1000mg 12.5/1000mg 12.5/1000mg 24시간 전 복용 중단 12.5/1000mg 12.5/1000mg 24시간 후 재복용 12.5/1000mg 24시 후 재복용 25/1000mg 25/1000mg 25/1000mg 25/1000mg 10/500mg 10/500mg 10/500mg 25/1000mg 25/1000mg 10/500mg 25/1000mg (원외) 10/500mg 10/500mg (원외) 1/250mg(원외) 2/500mg 10/500mg 10/750mg 10/750mg 10/750mg				-				
# metformin (원외) 24시간 전 복용 경단 기 12.5/500mg 12.5/1000mg 12.5/1000m		 가브스메트 정		-				
alogliptin + metformin 네시나 메트 정(원외) 12.5/500mg 12.5/1000mg 12.5/1000mg 12.5/1000mg 12.5/1000mg 5/500mg 5/1000mg 5/1000mg 5/1000mg 12.5/850mg 2.5/1000mg 12.5/1000mg 12.5/850mg 2.5/1000mg 12.5/1000mg 12.5/850mg 2.5/1000mg 12.5/1000mg 12.5/850mg 2.5/1000mg 12.5/1000mg (원외) 1/250mg(원외) 1/250mg(원외) 1/250mg(원외) 1/250mg 12/500mg 12	+ mettormin	: 3		24시간 전 복용				
+ metformin 네시나 네트 성(원외) 12.5/1000mg 수술 후 신기능 경/500mg 5/1000mg 13.5/500mg 5/1000mg 13.5/500mg 5/1000mg 13.5/500mg 5/1000mg 13.5/1000mg 13.5/1000mg 13.5/1000mg 13.5/1000mg 13.5/1000mg 13.5/1000mg 13.5/1000mg 2.5/1000mg 10/1000mg 10/500mg 10/500mg 10/500mg 10/500mg 10/500mg (원외) 1/250mg(원외) 1/250mg(원외) 1/250mg(원외) 1/250mg(원외) 1/250mg 10/1000mg 10/1000mg 1/2500mg 10/1000mg 10/1000mg 1/2500mg 10/1000mg 10/1000mg 1/2500mg 10/1000mg 10/1000mg 1/2500mg 10/1000mg 10/1000mg 10/1000mg 10/1000mg 1/2500mg 10/1000mg 10/1000mg 10/1000mg 10/1000mg 1/2500mg 10/1000mg 10/1000mg 10/1000mg 10/1000mg 10/1000mg 1/2500mg 10/1000mg 10/1000mg 10/1000mg 1/2500mg 10/1000mg 10/1000mg 10/1000mg 10/1000mg 1/2500mg 1/2500	alogliptin	12.5/500mg					
empaglilloZin + metformin 자디앙 듀오 정(원외) 5/1000mg 검사 후 재복용 검사 후 자복용 중단 하고 48시간 후 신기능검사 후 사람이에		네시나 베트 성(원외) 	12.5/1000mg	1				
# metformin	empagliflozin	지다아 도 이 권/인이\	5/500mg					
+ metformin	+ metformin	사니잉 규오 성(원외) 	5/1000mg	검사 우 새목용				
+ metformin	linagliptin		2.5/850mg	조연제 흐 보요				
dapagliflozin + metformin 직듀오 서방정(원외) 10/1000mg 10/500mg 후 신기능검사 후 재복용 gemigliptin + metformin 제미메트 서방정 25/1000mg 50/1000mg (원외) glimepiride + metformin 아마릴 엠 정 0마릴—멕스 서방정(원외) 1/250mg(원외) 2/500mg 아마릴—멕스 서방정(원외) 2/500mg teneligliptin 테넬리아 엠 서방정	+ metformin	트라센타 규오 성 	2.5/1000mg					
# metrormin 10/500mg 사목용 25/1000mg 모든 10/500mg 사목용 25/1000mg 50/1000mg (원외) 1/250mg(원외) 2/500mg 이마릴—멕스 서방정(원외) 2/500mg teneligliptin 테넬리아 엔 서방정 10/750mg	dapagliflozin	지든이 나타저(일이)	10/1000mg	후 신기능검사 후				
gemigliptin + metformin 제미메트 서방정 50/1000mg (원외) glimepiride + metformin 아마릴 엠 정 이마릴—멕스 서방정(원외) 1/250mg(원외) 2/500mg teneligliptin 테넬리아 엠 서방정 10/750mg	+ metformin	역규소 시항성(편피) 	10/500mg	재복용				
+ metformin			25/1000mg					
glimepiride + metformin 아마릴 엠 정 1/250mg(원외) 2/500mg 아마릴—멕스 서방정(원외) 2/500mg teneligliptin 테넬리아 엠 서방정		제미메트 서방정	50/1000mg					
glimepinde + metformin	- medomin		(원외)					
+ metformin 2/500mg 이마릴-멕스 서방정(원외) 2/500mg teneligliptin 테넬리아 엔 서방정 10/750mg		이마린 에 저	1/250mg(원외)]				
아마릴-멕스 서방정(원외) 2/500mg teneligliptin 테넬리아 엔 서방정 10/750mg		_ · · – – -	2/500mg					
		아마릴-멕스 서방정(원외)]				
+ metformin 20/1000mg		테넼리아 엠 서방정]				
	+ metformin	- 11 0 100	20/1000mg					

* 해열진통소염제의 경우 반감기와 배설 속도에 따라 다르므로 각 약품 정보를 확인하여야 합니다.

위 내용은 제약사의 허가사항과 국내외 가이드라인에 따라 정리하여 참고문헌, 환자상태, 의료진의 판단 등에 따라 상이하게 적용될 수 있습니다.

● 2022년 4차 약사위원회 통과 약물 ●

코드	사진	약품명	구분	성분	효능	용법	비고
DBPASS	HL 7HE	브론패스 정 [한림제약]	신규 원내 외	숙지황·목단피·오 미자·천문동·황금· 행인·백부근 연조 엑스(1.4~1.7—1)·옥 수수전분 혼합건조 물(4.8:1) 300mg	급성 기관지염	성인: 1일 2회, 1회 1정.	차광실온
DVENI	(113) (KD)	베니톨 정 [광동제약]	신규 원내 외	micronized purified flavonoid fraction 500mg	1. 정맥임파부전: 하지(다리)부종 (부기), 통증, 초기욕창 2. 치질	1. 정맥질환: 1회 1정, 1일 2회 식사시. 2. 급성치질: 처음 4일간 1회 3정, 1일 2회, 이후 3일간 1회 2정, 1일 2회.	차광실온
DW-NEWDI	নের বাস উপ্তম 1.09 চলচ্চিত্র হিল্লেক্সিক্সিক্সিক্সিক্সিক্সিক্সিক্সিক্সিক্সি	뉴디짐 주 1g [대웅바이오]	신규 원내	cefodizime sodium 1g	패혈증, 인후두염, 급성기관지염, 편도염(편도주위염, 편도주위농 양), 만성기관지염, 기관지확장증 (감염시), 만성호흡기질환의 2차 감염, 폐렴, 폐농양, 신우신염, 방 광염, 임균성요도염, 담낭염, 담 관염, 간농양, 복막염(골반복막염, 더그라스와농양), 자궁부속기염, 자궁내감염, 골반사강염, 자궁주 위조직염, 바르톨린선염(농양), 수 막염, 중이염, 부비동염.	1. 성인: 세포디짐으로서 1일 1-2g(역가)을 2회 분할하여 정맥 또는 점적정맥주사 2. 소아: 1일 체중 Kg당 60-80mg(역가)을 3-4회로 분할하여 정맥 또는점적 정맥주사 3. 난치성 또는 중증감염증: 1일 성인4g(역가), 소아는 체중 kg당 120mg(역가)까지 증량하여 분할 투여	실온
DV-SHING	STOCK AT TOOKS AT TOO	싱그릭스 주 [글락소 스미스클라 인]	신규 원내	Recombinant varicella zoster virus glycoprotein E (숙주세포주: CHO-K1, 벡터: pRIT14427) 50 μg /0.5㎡	대상포진 (HZ; herpes zoster)의 예방 - 만 50세 이상 성인 - 만 18세 이상에서 질병 혹은 치 료로 인한 면역저하 또는 면역 억제로 인하여 대상포진의 위 험이 높거나 높을 것으로 예상 되는 사람.	1회 0.5㎡씨, 2개월 간격 총 2회 근육 주사. 필요한 경우, 두 번째 접종을 첫 번째 접종 후 2~6개월 사이 면역이 저하/억제되거나 저하/억제되 기 쉬운 사람 중 더 짧은 접종 간격이 이로울 것으로 판단되는 경우, 두 번 째 접종은 첫 번째 접종 후 1~2개월 사이	차광냉장
DBDPREP1	Som Chieston	비디 클로라프렙 외용 액 3째 [지-리페]				외용으로 일회용으로만 사용한다. 알코올을 함유하고 있어 인화성 증기	
DBDPREP2	Second Charles	비디 클로라프렙 외용 액10.5㎖ [지-리페]	신규 원내	1ml중 chlorhexidine gluconate solution 0.1ml (20mg as chlorhexidine gluconate) isopropanol 0.7ml	수술 전 환자의 피부소독 또는 주 사기 바늘, 카테터 삽입 전 환자 의 피부 소독	를 발산하므로 화기를 가까이 하지 말고 환기가 잘 되는 곳에서 사용한다. 액이 완전히 마를 때까지 덮거나 발화원(예: 전기소작술, 레이저 등)을 사용하지 않는다(털이 없는 피부는 최소 3분, 털이 있는 경우 1시간까지). 젖은 물건은 처치 부위에서 치운다. 액이 고이지 않도록 한다: 처치용타월을 밀어 넣어 액을 흡수시킨 후	수술실만 사용 실온
DBDPREP3	Superior Transport	비디 클로라프렙 외용 액 26㎖ [지-리페]				다결을 일어 넣어 약을 흡수시간 후 제거한다.	

코드	사진	약품명	구분	성분	효능	용법	비고
DW- VOSEVI	GSI	보세비 정 [길리어드사이언스 코 리아]	신규 원외	sofosbuvir 400mg/ velpatasvir 100mg/ voxilaprevir 100mg	간경변이 없거나 대상성 간경변 (Child-Pugh A)이 있는 만성 C형 간염 바이러스 감염 성인 중 - NS5A 억제제가 포함된 HCV 요법으로 치료경험이 있는 유 전자형 1, 2, 3, 4, 5 또는 6 형 만성 HCV 감염의 치료, - NS5A 억제제 없이 소포스부비 르가 포함된 HCV 요법으로 치 료경험이 있는 유전자형 1a 또 는 3형 만성 HCV 감염의 치료	이전의 HBV 감염 증거를 검사해야 함. 권장 용량: 1일 1회 1정, 음식물과 함께	실온
DW- EPCLU	GSI 7916	엡클루사 정 [길리어드사이언스 코 리아]	신규 원외	sofosbuvir 400mg/ velpatasvir 100mg	본제 또는 본제를 리바비린과 병용하여 유전자형 1, 2, 3, 4, 5, 6형 만성 C형 간염 바이러스에 감염된 성인 및 만 12세 이상이고체중이 30 kg 이상인 소아 환자의 치료.	1일 1회 1정 본제 치료 전 HBsAg 및 anti-HBc 측정 만 12세 이상, 체중 30㎏ 이상인 유전 자형 1, 2, 3, 4, 5, 6형 HCV 대상 권장 치료 요법 및 기간: - 간경변이 없거나 대상성 간경변 (Child-Pugh A)이 있는 이전 치료 경험이 없는 환자 및 치료 경험이 있는 환자: 본제 12주 - 비대상성 간경변(Child-Pugh B, C) 이 있는 이전 치료 경험이 없는 환 자 및 치료 경험이 있는 환자: 본제 +리바비린 12주	실온
DTECF120	86-12 120 mg	텍피데라 캡슐 120mg [한국에자이]	신규 원외	dimethyl fumarate 120mg, 240mg	재발 이장성 다발성경화증의 치료.	성인: 초회량 1회 120mg, 1일 2회 7일 간 투여. 이후 1회 240mg, 1일 2회로 증량. 홍조와 위장관계 이상반응 시 일시적으로 1회 120mg, 1일 2회로	차광실온
DTECF240	BG-12 240 mg	텍 피 데 라 캡 슐 240mg [한국에자이]	면지	12011lg, 24011lg	\	감량, 1개월 이내에 1회 240mg, 1일 2회로 투여 재개. 음식물과 함께 복용, 부수거나 녹이지 않으며 한 번에 삼킴.	
DD-OZA		오자넥스 크림 [부광약품]	신규 원외	ozenoxacin 10mg/g	농가진의 단기 국소 치료	피부에 국소적으로 사용 - 성인 및 2개월 이상 소아: 감염 부위에 본제를 1일 2회, 5일간 얇게 도포 적용 부위는 100㎡ 이내. 12세 이하는 최대 체표면적의 2%.	실온

신약 사용개시일: 2023년 3월 1일 예정

⊙ 사용량 부진 의약품 ⊙

코드	약품	구분	결과	보험정보	비고
DO-EMYOG	마이오가드 점안액 0.125%	원내외	원외전환	690303201 DUR점검대상(비급여)	
DMARIS5	아리셉트 구강용해필름 5mg	원내외	원외전환	621100120(보)₩1,232/장 급여	
DECOX30	알콕시아 정 30mg	원내외	원외전환	655501850(보)₩311/정 급여	
DI-ENER160	에너제어 흡입용캡슐 150/50/160mcg	원내외	원외전환	653603360(보) W 74,115/30캡슐/팩 급여	
DI-ENER80	에너제어 흡입용캡슐 150/50/80mcg	원내외	원외전환	653603370(보)₩65,502/30캡슐/팩 급여	
DMPEMI5	페미로살 정 5mg	원내외	원외전환	642004190(보)\\225/정 급여	
DMPIMO	명인 피모짓 정 4mg	원내외	코드삭제	651900940(보) \\ 258/정 급여	
DD-EGF	이지에프 외용액 0.005%	원내외	코드삭제	641602122(보)₩291,000/10mL/병 급여	
DCOLN1GJ	글리아타민 주(대웅바이오)	원내	코드삭제	694001211(보) W 1,195/4mL/앰플 급여	
DW-DPM250J	피니페넴 주사 0,25g	원내	코드삭제	644914341(보)₩4,649/병 급여	
DIHEXO5	[CD] 헥소슈어 350 주 40㎖	원내	코드삭제	621803841(보)\\18,335/40mL/병 급여	
DI-EDUAK	듀어클리어 제뉴에어 400/12μg	원외	코드삭제	641605970(보)₩41,255/60회/통 급여	
DW-MZABO	자보란테 정	원외	코드삭제	642706340(보)₩3,995/정 급여	

약제부 게시판

● 생산중단/일시품절 ●

약품명	코드	사유	입고예정 및 대체약 안내
2022년 11월			
주사용후탄 50	DIFUT	장기품절	재공급일정은 23년 2분기로 예상 재고소진시 코드 불용예정. 동일성분약: 나파벨탄 주
보령 나프실린 나트륨 주 1g	DW-NAC1GJ	품절해제	장기품절로 코드불용이었으며 재입고로 사용 가능
캐롤 시럽 500ml	DMCARS	일시품절	원내재고 소진으로 코드 불용. 대체약: 어린이 부루펜 시럽 1000㎖
한미 플루 현탁용 분말 50ml	DOSTMS	일시품절	원내재고 소진으로 코드 불용, 재공급일정 미정 동일성분약: 타미플루 캡슐 30mg
액티라제 주사 20mg, 50mg	DTPA20J DTPA50J	공급불안	원내 재고는 있으나 공급 불안정으로 소량 공급 중 급여 대상 환자에게만 처방 권장
2022년 12월			
케릭스 주사 20mg/10ml	DC-LDX20J	공급불안	재공급 일정 지연되여 공급 불안정으로 소량 공급 중
일양 디세텔 정 50mg	DPVR50	일시품절	원내재고 소진 후 코드 불용 예정 재고 소진시 대체약 없으며 해당과 공지함
반코신 시피 1g 정주	DW-IVAN	품절해제	22년 11월 품절되었다가 재공급되어 처방가능함
테라마이신 안연고 3.5g	DO-TMO	공급중단	원내재고 소진 후 코드 불용 예정
유한 메토트렉세이트 주사액 25mg/ml	DC- JMTXD50J	품절해제	수급불안정으로 품절이었다가 재공급되어 처방 가능함
삼아 아토크 정 20mcg, 40mcg	DFOMT20 DFOMT40	생산중단	원내 재고 소진되어 코드불용
아다벤 주 10㎖	DADDA	품절해제	수급불안정으로 품절이었다가 재공급되어 처방 가능함
알콘 아트로핀황산염 1% 점안제	DO-1AT	품절해제	수급불안정으로 품절이었다가 재공급되어 처방 가능함
나보타 주 50단위	DNABO50	품절해제	수급불안정으로 품절이었다가 소량 재공급되어 처방 가능함
케이콘틴 서방정	DKCL600	품절해제	수급불안정으로 품절이었다가 소량 재공급되어 처방 가능함. 재품절 가능성 있음
2023년 1월			
팍스로비드 정	DPCOVID		유효기간으로 인해 타 의료기관으로 전배되어 현재 원내 재고는 없음
맥시부펜 시럽 500㎖	DDXIPFS	품절해제	수급불안정으로 품절이었다가 재공급되어 처방 가능함
듀코랄 액	DV-CHOLA	일시품절	원내보유재고는 유효기간 지나서 코드불용됨 재입고 2023년 8월 말 예정
이노테칸 주 2ml, 5ml	DC-IINO1 DC-IINO2	일시품절	원내재고 소진으로 코드 불용, 재입고 예정일 미정 동일성분약품: 캄토프 주 40㎜, 100㎜
뉴로메드 정	DOXRT800	코드불용	식약처 혈관성 인지 장애 증상 개선의 치료에 사용 중지 권고로 코드 불용
싸이크로질 1% 점안액	DO-ECYCL	일시품절	원내재고 소진 후 코드 불용예정. 재입고 예정 2023년 7월 대체약은 없으며 해당과 공지함
2023년 2월			
호쿠날린 패취 0.5mg, 1mg, 2mg	DD-TL0.5P DD-TL1P DD-TL2P	생산중단	호쿠날린 패취 1mg, 2mg은 유효기간 만료로 원내재고 없음. 호쿠날린 패취 0.5mg는 재고 소진으로 코드 불용됨. 대체약: 레스날린 패취 0.5mg
플레옥스틴 주 5mg/ml 30ml	DC-IPLE03	일시품절	원내재고 소진되어 코드 불용. 재입고 2023년 5월 예정 동일성분약품: 플레옥스틴 주 10㎖, 20㎖, 옥살리틴 주 30㎖
마이오스타트 주	DO-EMIS	일시품절	2022년 11월부터 지속적인 공급불안정으로 원내 재고소진 후 코드불용 예정. 대체약은 없으며 해당과 공 지함



조선대학교병원 의약정보지 2023. 2 PHARMACY NEWSLETTER OF THE CHOSUN UNIVERSITY HOSPITAL

조선대학교병원 약제부 의약정보실

발 행 인:장혜영

편집위원: 박선희, 오재기, 김소영