



의약정보

2023. 11
Vol.27 No.4

◎ 2023년 3차 약사위원회 통과 약물 ◎

코드	약품명	구분	성분 및 함량/단위	효능	용법	비고
DNBVL25	네비레트 엠 정 2.5mg	용량추가 원내외	nebivolol hydrochloride 2.725mg (2.5mg as nebivolol)	본태성 고혈압, 만성 심부전(경증-중등증의 만성 안정형 심부전이 있는 70세 이상 노인 환자에서 표준 치료시 보조치료).	1. 본태성 고혈압: 성인: 1일 1회 5mg, 65세 이상: 초회 1일 1회 2.5mg, 필요시 1일 5mg으로 증량. 2. 만성 심부전: 70세 이상: 초회 1일 1회 1.25mg, 1일 최대 10mg.	
DMROSUV10	로수바미브 정 10/10mg	제조사추가 원내전환	ezetimibe (micronized)/ rosuvastatin calcium 10/10mg	원발성 고콜레스테롤혈증 또는 혼합형 이상지질혈증의 상승된 총콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, 아포B단백, 트리글리세라이드, non-HDL-콜레스테롤을 감소시키고, HDL-콜레스테롤을 증가시키기 위한 식이요법의 보조제.	식사와 관계없이 1일 1회 투여, 초회량 1일 10/5mg, 1일 최대 10/20mg.	
DMROSUV20	로수바미브 정 10/20mg		ezetimibe (micronized)/ rosuvastatin calcium 10/20mg			
DMYCO250	마이코놀 캡슐 250mg	제조사추가 원내외	mycophenolate mofetil 250mg	중등 신장-심장-간장 이식환자에 대한 급성 장기 거부반응 방지, 시클로스포린 및 코르티코스테로이드와 병용해야함.	신장이식: 성인 1g씩 1일 2회, 심장-간이식: 성인 1회 1.5g, 1일 2회.	
DARPI	아빌라피아 정 1mg	용량추가 원내외	aripiprazole 1mg	1. 조현병 2. 양극성장애와 관련된 급성 조증 및 혼재삽화 3. 주요 우울장애의 부가요법 4. 자폐장애와 관련된 과민증 5. 뚜렛장애	1. 성인 초회 1일 1회 10mg 또는 15mg, 1일 10-30mg 내에서 조정. 2. 성인 단독 및 보조요법으로 초회 1일 1회 15mg, 1일 30mg까지 증량 가능. 3. 초회 1일 1회 2-5mg. 4. 6-17세 1일 5-15mg에서 유효성 입증 5. 6-18세 1일 2-20mg에서 유효성 입증	
DYGSERT25	영진 설트랄린 정 25mg	신규 원내외	sertraline hydrochloride (25mg as sertraline)	우울증, 성인 및 소아 강박장애의 치료, 공황장애의 치료, 외상 후 스트레스 장애의 치료, 사회불안장애(사회공포증)의 치료, 월경 전 불쾌장애의 치료.	- 우울증과 강박장애: 초회 1일 1회 50mg, 유지 1일 50-100mg, 최대 200mg. - 공황장애, 외상후 스트레스장애, 사회불안장애: 초회 1일 1회 25mg, 1일 최대 200mg. - 월경 전 불쾌장애: 1일 1회 50mg 월경주기 동안(최대 150mg) 또는 월경주기 중 황체기에만(최대 100mg)	산도스 설트랄린 정 50mg 대체
DYGSERT50	영진 설트랄린 정 50mg	대체 원내외	sertraline hydrochloride (50mg as sertraline)			
DC-ONU200	오뉴렉 정 200mg	신규 원내외	azacitidine 200mg	유도요법 이후 완전 관해(CR) 또는 불안정한 혈액학적 회복을 동반한 완전관해(CR)를 달성하고, 조혈모세포이식(HSCT)이 적합하지 않은 AML 성인에서의 유지요법	권장 용량: 아자시티딘 300mg, 1일 1회 경구투여, 14일의 투여 기간과 그 후 14일의 휴약 기간(28일 투여 주기)으로 구성.	
DC-ONU300	오뉴렉 정 300mg		azacitidine 300mg			
DN-OXY10	오코돈 정 10mg	신규 원내외	oxycodone hydrochloride 10mg	마약성 진통제 사용이 필요한 중등도 및 심한 통증의 완화.	18세 이상 이전에 마약성 진통제를 복용하지 않은 자: 초회용량 4-6시간마다 5mg.	마약 처방
DC-INREB	인레빅 캡슐	신규 원내외	fedratinib dihydrochloride monohydrate (micronized) 117.3 mg (100mg as fedratinib)	이전에 루소리티닙으로 치료를 받은 성인의 다음 질병과 관련된 비장비대 또는 중상의 치료: 일차성 골수섬유증, 진성적혈구증가증 후 골수섬유증, 본태성혈소판증가증 후 골수섬유증	1일 1회 페드라티닙으로서 400mg, 루소리티닙 치료를 받고 있는 경우, 본제 치료 시작 전 루소리티닙 서서히 감량하여 중단, 고지방식이와 함께 투여시 오심/구토의 발생을 감소시킬 수 있으므로 식후 복용 권장.	
DZEPOST	제포시아 캡슐 스타터팩 0.23mg/0.46mg	신규 원내외	ozanimod hydrochloride 0.25mg (0.23mg as ozanimod) 0.5mg (0.46mg as ozanimod)	보편적인 치료제(코르티코스테로이드, 면역억제제 등의 치료) 또는 생물학적 제제에 적절히 반응하지 않거나, 반응이 소실되거나 또는 내약성이 없는 성인의 중등증에서 중증의 활동성 궤양성 대장염의 치료.	용량 증량 요법. - 1~4일: 1일 1회 0.23mg. - 5~7일: 1일 1회 0.46mg. - 8일 이후: 1일 1회 0.92mg. 캡슐을 통째로 삼켜야 하며, 음식 상관없이 투여 가능.	
DZEPOMA	제포시아 캡슐 0.92mg		1mg (0.92mg as ozanimod)			
DCANA125	카나보센 정 125mg	신규 원내외	bosentan hydrate 129,082mg (125mg as bosentan)	폐동맥고혈압의 운동능력 및 증상개선, 기능 분류 클래스 II에 해당하는 폐동맥고혈압의 임상적 악화의 지연, 전신경화증에 기인한 활동성 수치/족지 궤양증의 새로운 수치/족지 궤양증 발생 감소	초기용량: 첫 4주간 1회 62.5mg, 1일 2회, 유지용량: 투약 5주째부터 1회 125mg, 1일 2회.	
DW-CRES100	크레셀바 캡슐 100mg	제형추가 원내외	isavuconazonium sulfate 186.3 mg (100mg as isavuconazole)	만 18세 이상의 침습성 아스페르길루스증 치료, 만 18세 이상의 암포테리신 B 투여가 적합하지 않은 침습성 탈곰팡이증 치료.	부하용량: 2캡슐, 첫 48시간 동안 8시간마다 투여(총 6회), 유지용량: 마지막 부하용량 투여 12-24시간 후, 1일 1회 2캡슐.	
DC-MP50	푸리네톤 정	원내전환 원내외	mercaptopurine hydrate 50mg	급성백혈병(급성 림프모구백혈병/급성 골수성백혈병)의 유지치료, 만성 골수성백혈병.	성인/소아: 2.5mg/kg/day, 투여용량/기간은 병용약물 및 개개환자에 따라 조절.	
DH-PREDA2	프레다 정 2mg	용량추가 원내외	estradiol hemihydrate (micronized) 2.07mg (2mg as estradiol)	에스트로겐 결핍 증상(갱년기장애), 폐경 후 골다공증의 예방.	1일 1회 1 또는 2mg을 중단 없이 복용, 부작용시 1mg 투여, 자궁적출술 받았거나 폐경 여성은 편리한 날 어느 때라도 시작 가능, 정상적인 월경이 있는 경우 월경주기 제 5일부터 투여.	차광

코드	약품명	구분	성분 및 함량/단위	효능	용법	비고
DD-MUIPRO	리노로신 나잘 연고 6g	대체 원내외	mupirocin calcium hydrate 21.5mg/g	비강내 MRSA의 제균 1. MRSA감염 발병 위험이 높은 면역 기능 저하 상태에 있는 환자 2. 위 환자로부터 격리하는 것이 곤란한 입원환자 또는 위 환자와 접촉하는 보건의료종사자	1일 3회, 비강에 도포. 양쪽 비강에 성냥머리 크기의 양을 도포, 코 측면을 눌러 확산되도록 함. 최소기간만 투여.(3일정도)	에스와이 무피로신 나잘 연고 5g 대체
DFIL300F	그라신 프리필드 시린지 주 300µg/0.7ml	용량추가 원내	filgrastim 300µg/0.7ml	1-1. 고형암에 대해 항암화학요법을 받고 있는 환자의 호중구 감소증. 1-2. 혈액종양에 대해 항암화학요법을 받고 있는 환자의 호중구 감소증. 2. 골수 이형성 증후군에 따른 호중구 감소증. 3. 재생 불량성 빈혈에 따른 호중구 감소증. 4. 선천성·특발성 호중구 감소증. 5. HIV 감염증치료에 지장을 초래하는 호중구 감소증. 6. 조혈모세포의 말초혈중으로의 동원. 7. 조혈모세포이식시의 호중구 수 증가 촉진.	1-1. 1일 1회 50mcg/m ² 피하투여. 피하투여 곤란시 100mcg/m ² 정주 1-2. 1일 1회 100mcg/m ² 피하투여. 피하투여 곤란시 200mcg/m ² 정주 2. 1일 1회 100mcg/m ² 3. 1일 1회 400mcg/m ² 4. 1일 1회 50mcg/m ² 피하투여. 5. 1일 1회 200mcg/m ² 6. 400mcg/m ² 을 1일-2회 S.C. 7. 1일 1회 300mcg/m ²	냉장차광
DNEOIRRI	네오로닌 관류제	신규 원내	1ml 중 neomycin sulfate 57mg (40mg as neomycin) polymyxin B sulfate 200000IU	유치 카테터가 삽입된 환자의 감염 예방	[방광 관류제 투여량] 네오마이신 40mg/일 및 폴리믹신B 200,000단위/일, 연속 방광관류 실시. 투여속도는 소변량에 따라 조절.	냉장차광
DDPLM300P	듀피젠트 프리필드 펜 300mg	제형추가 원내	dupilumab 속주: CHO K1 RGC70, 벡터: pRGN4639, pRGN4640 300mg/2ml	1. 아토피 피부염 2. 천식 3. 비용종을 동반한 만성 비부비동염	1. 아토피 피부염: 초회 600mg, 이후 2주 간격 300mg 피하주사 2. 천식: 초회 400mg, 이후 2주 간격 300mg 피하주사 3. 비용종을 동반한 만성 비부비동염: 2주 간격 300mg 피하주사	냉장차광
DLEVOCO	레보코 주	대체 원내	polydeoxyribonucleotide sodium 5.625mg/3ml	피부이식으로 인한 상처의 치료 및 조직 수복.	1일 1 바이알 근주 또는 피하주사.	하이디알 프리필드 주 대체
DC-VAGZ400	베그젤마 주 16ml	제조사추가 원내	bevacizumab 400mg/16ml	전이성 직결장암, 전이성 유방암, 비소세포폐암, 진행성 또는 전이성 신세포암, 교모세포종, 상피성 난소암, 난관암 또는 원발성 복막암, 자궁경부암	전이성 직결장암: 매 2주마다 1회씩, 1회 5mg/kg 또는 10mg/kg 혹은 매 3주마다 1회씩, 1회 7.5mg/kg 또는 15mg/kg 점적정주. 이하 생략	
DAMELU	아멜리부 주 10mg/ml (0.23ml)	신규 원내	ranibizumab E. coli WCM203, 벡터 : pBaB202-2-M2 2.3mg /0.23ml	1. 신생혈관성(습성) 연령관련 황반변성의 치료, 당뇨병성 황반부종에 의한 시력 손상의 치료, 증식성 당뇨망막병증의 치료 2. 망막정맥폐쇄성 황반부종에 의한 시력 손상의 치료 3. 맥락막 신생혈관 형성에 따른 시력 손상의 치료.	0.5mg(0.05ml), 1개월 이상 투여간격. 1. 초기 투여는 3회 또는 그 이상 매달 투여 가능. 2. 1달에 1번. 3. 1회 투여 후 개별 결정.	냉장차광
DH-ANGELPEN	엔젤라 프리필드 펜 주 60mg	대체 원내	somatogron 속주: DG44 CHO Cells 벡터:pCI-DHFR-MOD-4023 50mg	뇌하수체 성장호르몬 분비장애로 인한 만 3세 이상의 성장부전	0.66mg/kg, 매주 1회 피하주사. 30mg이상의 용량 필요 시(즉, 체중 > 45kg), 2회 주사.	유티로핀 플러스 주 대체 냉장
DC-NVM240J	옵디보 주 240mg	용량추가 원내	nivolumab 240mg/24ml	흑색종, 비소세포폐암, 악성 흉막 중피종, 신세포암, 전형적 호지킨 림프종, 두경부 편평세포암, 요로상피세포암, 위선암, 위식도 접합부 선암 또는 식도선암, 식도암, 전이성 직결장암	-본제 권장용량: 3mg/kg, 2주 간격 또는 240mg, 2주 간격 또는 480mg, 4주 간격. 30분간 정맥 점적주입. -투여기간: 질환이 진행되거나 허용 불가능한 독성 발생 전까지 투여. 이하 생략	냉장차광
DC-GEMZS200	젬자 액상 주 5.26ml	대체 원내	gemcitabine hydrochloride 43.27mg/ml (38mg as gemcitabine), 200mg/5.26ml	비소세포폐암, 췌장암, 방광암, 유방암, 난소암, 담도암	1. 비소세포폐암 1) 시스플라틴 병용요법 2) 단독요법 2. 췌장암: 단독요법 3. 방광암: 병용요법 시스플라틴 4. 유방암: 병용요법 파클리탁셀 5. 난소암: 병용요법 카보플라틴 6. 담도암: 병용요법 시스플라틴 1000mg/m ² ~1250mg/m ²	젬자 주 200mg, 1g 대체 냉장
DC-GEMZS1G	젬자 액상 주 26.3ml		gemcitabine hydrochloride 43.27mg/ml (38mg as gemcitabine), 1g/26.3ml			
DPERAV300	코미플루원스 주	신규 원내	peramivir hydrate 349.4mg/60ml (300mg as peramivir)/백	2세 이상의 A형 또는 B형 인플루엔자 바이러스 감염증의 치료.	증상 발현 후, 가능한 신속히 본제 투여를 시작하는 것이 바람직함. 성인: 300mg를 15분 이상 단회 점적정주 (중증화 우려 시 600mg)	
DCOSEN300P	코센틱스 우노레디 펜 300mg/2ml	용량추가 원내	secukinumab 300mg	1. 판상 건선 2. 건선성관절염 3. 축성척추관절염	1. 1회 300mg, 제 0, 1, 2, 3, 4주에 피하 투여, 이후 4주마다 투여. 체중 90kg 이상 300mg 2주마다 투여가능. 2. 1회 150mg, 제 0, 1, 2, 3, 4주에 피하 투여, 이후 매 4주마다 투여. 1회 300mg 증량 가능. 3. 1회 150mg, 제 0, 1, 2, 3, 4주에 피하 투여, 이후 매 4주마다. 1회 300mg 증량 가능.	냉장차광

코드	약품명	구분	성분 및 함량/단위	효능	용법	비고
DKYNTEPEN	킨텔레스 프리필드 펜 주	제형추가 원내	vedolizumab 108mg/0.68mL	1. 궤양성 대장염 2. 크론병 보편적 치료 (코르티코스테로이드제나 면역 억제제 등의 치료) 또는 중앙 괴사인자 알파억제제 치료에 반응을 나타내지 않거나, 반응이 없었거나, 또는 내약성이 없는 중등도-중증 활성 궤양성대장염, 크론병의 치료	300mg을 최소 2회 정맥 주입 후 치료적 유익성을 보인 경우, 유지요법으로 본제 108mg을 매 2주마다 피하주사(SC). 첫 피하주사 용량은 다음에 예정된 정맥 주입 용량 대신 투여하며, 그 이후 매 2주마다.	냉장차광
DFLUZO,5J	플루닐 주사 5mL	대체 원내	flumazenil 0.1mg/mL	벤조디아제핀계 약물의 중추진정작용 역전	마취시: 초회 권장 투여량 0.2mg을 15초 이내에 정주, 통상 0.3-0.6mg, 최대 1mg. 중환자 치료시: 초회 권장투여량 0.3mg, 필요시 총투여량이 2mg이 될때까지 반복투여 가능.	명문 플루마제닐 주 대체
DNEXON	넥스온 정 20mg	대체 원외	esomeprazole magnesium trihydrate 22.3mg (20mg as esomeprazole)	위식도 역류질환, 헬리코박터필로리 박멸을 위한 항생제 병용요법, NSAID 투여 관련 상부 위장관 증상치료의 단기요법, 지속적인 NSAID투여가 필요한 경우, 출혈가-엘리스 증후군의 치료, 정맥주사로 위궤양 또는 심이지장궤양에 의한 재출혈 예방 유도 이후의 유지요법	1) 미란성 역류식도염의 치료: 4주간 1일 1회 40mg. 2) 식도염 재발 방지 위한 장기간 유지요법: 1일 1회 20mg. 3) 식도염 없는 위식도 역류질환 증상치료요법: 1일 1회 20mg.	넥사움 정 20mg 대체
DDIP10/100	디피투 정 10/100mg	신규 원외	dapagliflozin propanediol hydrate 12.3mg (10mg as dapagliflozin), sitagliptin phosphate hydrate 128.5mg (100mg as sitagliptin)	시타글립틴과 다파글리플로진의 병용투여가 적합한 제2형 당뇨병의 혈당 조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여.	본제는 시타글립틴 100mg과 다파글리플로진 10mg 투여 환자에게 1일 1회 1정 투여. 식사와 관계없이 투여 가능, 통째로 삼켜 복용.	
DLAYBO	레이본 정	제조사추가 원외	당귀·목과·방풍·속단·오가피·우슬·위령선·육계·진교·천궁·천마·홍화 25% ethanol soft ext. (3.5-1) 405.4mg	골관절증의 증상 완화.	성인: 1회 1정, 1일 2회.	
DLIMAR	리마리프 정	제조사추가 원외	limaprost alfadex 166.67µg (5µg as limaprost)	폐색성혈전혈관염에 의한 궤양, 동통, 냉감 등의 허혈성 증상의 개선, 후천성 요부척추관 협착증에 의한 자각 증상 및 보행 능력의 개선.	- 폐색성혈전혈관염에 의한 궤양, 동통, 냉감 등 허혈성 증상 개선: 성인 1회 2정, 1일 3회. - 후천성 요부척추관 협착증에 의한 자각 증상 (하지동통, 하지저림) 및 보행능력개선: 성인 1회 1정, 1일 3회.	
DACERI	아세리손 정	신규 원외	eperisone hydrochloride 75mg aceclofenac 100mg	근골격계 근육 연축 증상을 동반한 급성 요통의 통증 완화	성인 1회 1정, 1일 2회, 식후 투여. 분쇄하거나 분할 또는 씹지 않고 전체를 복용.	
DMAGNES	마그네스 정	신규 원외	magnesium lactate hydrate 470mg (48mg as Mg) pyridoxine hydrochloride 5mg	임신·수유기, 병중·병후의 체력저하 시 비타민 B6의 보급, 마그네슘 결핍으로 인한 근육경련	마그네슘 결핍: 1회 2정 1일 3회.	
DMAXEL	맥세렌디 정	신규 원외	sodium selenite pentahydrate 0.666mg (200µg as selenium), cholecalciferol concentrate powder 10mg	다음 경우의 비타민 D의 보급 - 임신·수유기, 발육기, 노년기	만 12세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 복용.	
DMULT-F	멀티블루 에프 정	신규 원외	29.16mg as thiamine HCl, pyridoxine 50mg, cyanocobalamin 0.5mg, 15mg as Zn, 100µg as selenium, 6.25µg as chrome, 1mg as manganese	1. 비타민 B1, B6의 보급 2. 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염, 각기, 눈의 피로의 완화 3. 아연의 보급	만 12세 이상 및 성인: 1일 2회, 1회 1정 복용 또는 1일 1회, 1회 2정 복용	
DYGSERT100	영진 설프랄린 정 100mg	대체 원외	sertraline hydrochloride (100mg as sertraline)	우울증, 성인 및 소아 강박장애의 치료, 공황장애의 치료, 외상 후 스트레스 장애의 치료, 사회불안장애(사회공포증)의 치료, 월경 전 불쾌장애의 치료.	- 우울증과 강박장애: 초회 1일 1회 50mg, 유지 1일 50-100mg, 최대 200mg. - 공황장애, 외상 후 스트레스장애, 사회불안장애: 초회 1일 1회 25mg, 1일 최대 200mg. - 월경 전 불쾌장애: 1일 1회 50mg 월경주기 동안(최대 150mg) 또는 월경주기 중 황체기에만(최대 100mg)	산도스 설프랄린 정 100mg 대체
DZEDA50/10	제미다파 정	신규 원외	gemigliptin tartaric acid 1.5 hydrate 68.9mg (50mg as gemigliptin), dapagliflozin 10mg	제미글립틴과 다파글리플로진의 병용투여가 적합한 제2형 당뇨병의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여.	제미글립틴 50mg과 다파글리플로진 10mg 투여자에 식사와 관계없이 1일 1회 1정.	
DTRUDA	트루다파 정 10mg	제조사추가 원외	dapagliflozin bis L-proline 15.63mg (10mg as dapagliflozin)	제 2형 당뇨병의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여. 1. 단독요법 2. 병용요법	단독 및 병용요법: 1일 1회 10mg. 초기 병용요법: 이전 당뇨병 약물치료를 받은 경험이 없는 경우 메트포르민 병용시, 1일 1회 5mg 또는 10mg. 음식섭취와 무관 통째로 복용	
DPEZET2/10	페바로젯 정 2/10mg	제조사추가 원외	pitavastatin calcium 2mg/ ezetimibe 10mg	원발성 고콜레스테롤혈증 또는 혼합형 이상지질혈증의 상승된 총 콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, apo B 단백질, 트리글리세라이드 및 non-HDL-콜레스테롤을 감소시키고, HDL-콜레스테롤을 증가시키기 위한 식이요법의 보조제로서 투여.	성인: 식사와 관계없이 1일 1회 투여. 권장 초회용량: 1일 1회 2/10mg, 필요시 1일 최대 4/10mg까지 증량. 4주 또는 그 이상의 간격을 두고 용량 조절.	차광
DPEZET4/10	페바로젯 정 4/10mg		pitavastatin calcium 4mg/ ezetimibe 10mg			
DD-FINJU	핀주베 스프레이	신규 원외	finasteride 2.275mg/mL	성인 남성(만 18-41세)의 경증 - 중등도 남성형 탈모 치료.	1회 1-4번 분사, 1일 1회 두피의 탈모 부위에 도포, 두피에만 사용.	

약제부 게시판

◎ 생산중단 / 일시품절 ◎

약품명	코드	사유	입고예정 및 대체약 안내
■ 2023년 8월			
코트림 주사액	DW-COTRIM	생산중단	원내 재고 소진되어 코드불용. 동일성분 경구약: 셉트린 정
세레타이드 디스커스 250 60dose(원외), 100 60dose(원외)	DI-SRT250 DI-SRT100	일시품절	수입지연으로 인하여 재공급 일정미정. 원외코드 불용됨 유사효능약: 플루테롤 흡입용 캡슐 100/50, 플루티폼 흡입제 125µg/5µg, 250µg/10µg
세로나제 정	DMSERO	생산중단	재고 소진되어 코드 불용. 유사효능약: 로멜라민 장용정
리립 정 0.25mg	DRPN0.25	일시품절	재고 소진으로 코드 불용. 대체약: 파키놀 정 0.25mg
위너프 주 736ml	DAM-WINC1	일시품절	재고 소진되어 코드 불용됨. 재공급 예정일: 9월 11일 이후
플미칸 분무용 현탁액 500mcg/2ml	DI-EPULMIN	일시품절	원의 공급불안정으로 원외처방시 주변약국 재고확인 후 처방가능 (원내 보유재고는 입원환자와 외래원내 사용가능)
오마스 미니 연질캡슐 2g	DOAMM2	일시품절	원의 공급불안정. 동일성분: 프라임 오메가 연질캡슐 1g(용량다름)
파라마셋 세미 정	DULTCSM	일시품절	원의 공급불안정. 동일성분약: 파라마셋 정(용량다름)
보령 퀘스트란 현탁용산	DCHOLP	생산중단	허가취하로 인하여 원내재고 소진 후 코드 불용
트리악손 주사 500mg	DW-ITRIA	일시품절	원내 재고 소진시 코드 불용예정. 대체약: 보령 세프트리악손 주 0.5g
페미로살 정 10mg	DMPEM10	생산중단	허가취하로 9월 1일자로 코드 불용. 동일성분: 페미로살 정 5mg(원외)
■ 2023년 9월			
유박신 주 1.5g	DW-IUBACT	일시품절	재고 소진으로 인해 코드불용. 대체약: 시너탐 주 1.5g
위너프 주 736ml	DAM-WINC1	품절해제	일시품절 해제되어 정상입고되어 처방가능함
스토크린 정 600mg	DEVZ600	생산중단	허가취하로 인한 공급중단으로 코드불용
트루패스 정 4mg	DSILD4	일시품절	재고 소진되어 코드 불용됨. 대체약: 트루패스 구강붕해정 8mg(용량다름)
트루리시티 1.5mg/0.5ml 일회용 펜	DH-DL15P	일시품절	재공급 예정 10월 중순 기간내 원내 재고 소진시 코드 불용 예정 트루리시티 0.75mg/0.5ml 일회용펜도 공급불안정
트랜스텍 패취 35µg/h, 52.5µg/h, 70µg/h	DBUPN35P DBUPN52.5P DBUPN70P	생산중단	허가취하로 인한 공급 중단 원내 재고 소진시 코드 불용예정
졸토피 플렉스터치 주	DH-XUL	일시품절	원내 재고 소진시 코드 불용예정. 재공급일정 미정
후루오레사이트 주사 10% (Vial)	DO-IFLUO1	일시품절	재공급 23년 11월 초 예정. 해당과 공지함
유티로핀 플러스 주	DH-UTPL24J	생산중단	허가취하 및 원내 재고 소진으로 코드 불용됨 대체약: 엔젤라 프리필드펜주 60mg
오구멘틴 듀오 시럽 228mg/5ml 50ml	DW-MAUGDS	일시품절	원내 재고 소진시 코드 불용예정. 재공급 일정 미정. 대체약: 맥시크란 듀오 시럽 50ml
■ 2023년 10월			
녹십자 아이비글로불린 에스엔 주 10% 50ml, 100ml, 200ml 리브감마 에스엔 주 3g/60ml, 10g/200ml	DIVGSN50 D10VGI0GJ D10VIG20GJ DLVGM3000J DILVGI0	공급불안	원료 수급의 문제로 인해 공급이 원활하지 않음 모두 매달 소량씩 입고되는 상황으로 입고분도 재고 소진 후 상황에 따라 공급이 어려울 수 있음
뉴트로진 주 250mcg	DLGT250J	품절해제	일시품절 해제되어 정상입고되어 처방가능함
트루패스 정 4mg	DSILD4	품절해제	일시품절 해제되어 정상입고되어 처방가능함
담토신 주 350mg	DW-DAP2	품절해제	일시품절 해제되어 정상입고되어 처방가능함
달라트렌 에스알 캡슐 8mg	DMDIL8	품절해제	원외약으로 일시품절 해제되어 원외 처방가능함
카멕스 캡슐	DW-MCAM	생산중단	원내재고 소진되어 코드불용됨 동일성분: 보령 듀리세프 건조시럽 250mg/5ml 150ml 세파세데 경구 항생제: 메섹신 캡슐 500mg (성분다름)
알콘 아트로핀황산염 1% 점안제	DO-1AT	일시품절	원내재고 소진 후 코드불용 예정. 재공급 12월 초 예정이며 대체약은 없음
유한 세피졸린 주 1g	DW-ICEFAZ1	일시품절	원내재고 소진시 코드불용 예정. 재공급되어 사용가능함
사이토텍 정 200µg	DMCYCT	일시품절	원내재고 소진 후 코드불용 예정. 재공급일정은 12월 후반
알닥톤 필름코팅정 25mg	DMALD1	공급불안	원의 공급원활하지 않아 알닥톤 정과 다른 용량이며 동일성분인 스피락톤 정 50mg 원외로 사용가능
타미플 주	DVITMVRJ	일시품절	원내재고 소진되어 코드불용. 대체약: 엠비에에취 주 (Vial)
일파간피 점안액 0.15% 5ml	DO-BMDP	일시품절	원내재고 소진 후 코드불용 예정이며 대체약은 없음
한국노바티스 시프로바이 점이현탁액	DECIPR	일시품절	원내재고 소진 후 코드불용 예정 원내 유사약: 실로텍스 점이현탁액 (일부성분, 용량, 적응증 다름)
■ 2023년 11월			
지노트로핀 주	DH-IGENOP	일시품절	원내재고 소진 후 코드불용 예정. 재공급일정은 2024년 2월 예정
옵니세프 캡슐 100mg 옵니세프 소아용 시럽 100g	DW-CDN100 DW-CDNG	일시품절	원내재고 소진 후 코드불용 예정으로 재공급 11월 예정 대체약은 원내 3세대 세파게 항생제 경구약제 (메이엑트 정, 슈프락스 캡슐, 바난 정, 바난 건조 시럽)
아일리아 주사	DAFBCJ	일시품절	원내재고 소진시 코드불용 예정. 재공급 2024년 1월 예정으로 재공급 이전 재고 소진시 해당과 논의.
이노테칸 주 2ml	DC-IINO1	일시품절	원내재고 소진시 코드불용 예정. 재공급은 2024년 6월 예정 원내동일제약사: 이노테칸 주 5ml(용량다름)



의약정보

조선대학교병원 의약정보지 2023. 11
PHARMACY NEWSLETTER OF THE CHOSUN UNIVERSITY HOSPITAL

조선대학교병원 약제부 의약정보실
발행인: 장혜영
편집위원: 박선희, 오재기, 김소영