



◎ 원내 코로나19 경구치료제약품 정보 ◎

상품명	팍스로비드 (PAXLOVID)	
성분/함량	분홍색 nirmatrelvir 150mg (2정) 흰색 ritonavir 100mg (1정)	
코드	[DPCOVID (일반용 팍스로비드)] / [DPCOVID-KL 신기능 감소용 팍스로비드]	
효능효과	PCR 검사 등을 통해 코로나 바이러스 감염증-19가 확진된 환자로서, 중증으로 진행될 위험이 높은 경증-중등증 성인 및 소아(12세 이상, 체중 40kg 이상)의 치료.	
용법용량	니르마트렐비르 300mg (150mg 2정), 리토나비르 100mg(100mg 1정)를 함께 복용, 1일 2회(12시간마다), 5일간 복용. 코로나19 양성 판정을 받고 증상 발현 후 5일 이내에 투여 시작. 식사와 관계없이 복용 코로나19 양성 판정을 받고 증상 발현 후 5일 이내에 투여가 시작되어야 함 통째로 삼켜야 하며 씹거나 부수지 않아야 함 총 30정 복용	◀ 신장에 환자 - 중요 투여 정보 ▶ 경증의 신장에 환자(eGFR $\geq 60 \sim < 90$ mL/min)에서 용량 조절 불필요 중등도의 신장에 환자(eGFR $\geq 30 \sim < 60$ mL/min) 이 약의 용량은 니르마트렐비르 150mg와 (1정) 리토나비르는 100mg(1정)을 1일 2회 5일간 투여로 감량한다
이상반응	common : 설사, 미각 이상 근육통	serious : 간염, 황달
복용시 주의사항	바이러스 제거를 최대화 하고, 코로나19의 전파를 최소화 하기 위해 5일간이 전체 치료과정을 완료하고 공중 보건 권고에 따라 격리를 유지하는 것이 중요함 복용 할 시간을 기준으로 8시간이 지나지 않은 경우, 가능한 빨리 복용하고 다음번 약은 다음번 복용 시간에 맞춰 복용 해야함 복용 할 시간을 기준으로 8시간이상 지난 경우, 다음번 복용 시간에 1회 용량을 복용 해야하고, 누락분 보충을 위해 2회 용량을 복용 해서는 안됨	
병용금지	알파1-아드레날린 수용체 : 알푸조신 진통제 : 페티딘, 피록시칸, 프로포시펜 항협심증약 : 라놀라진 항부정맥약 : 아마오다론 드로네다론 플레카이니드 프레파페논퀴니딘	항통풍약 : 콜키신 항정신병약 : 루라시돈, 피모자이드, 클로자핀 맥각 유도제 : 디히드로 에르고타민, 에르고타민, 메틸 에르고노빈 진정수면제 : 트리아졸람, 경구용 미다졸람
투여방법	일반용 (정상신기능) 경구 치료제 투여시 1. 처방명칭 : 일반용 팍스로비드(COVID-19 치료제 30정) 2. 약제부 투약단위 : 1box 단위 투여(10dose 처방, 총 30정) 3. 병동 투약 시 용량, 용법 : 1회 3정씩, 1일 2회(아침, 저녁 식후) 4. 병동 처방 시 지침약 처방(self 처방) 형식으로 1일분씩 처방	신기능 감소용 경구 치료제 투여시 1. 처방명칭 : 신기능감소용 팍스로비드(COVID-19 치료제 20정) 2. 약제부 투약단위 : 1box 단위 투여(10dose 처방) 3. 신기능 감소 시 감량투약 : 약제부에서 감량된 용량으로 1box 투여함. (1dose=2정, 총 20정) 4. 병동 투약 시 용량, 용법 : 1회 2정씩, 1일 2회(아침, 저녁식후) 5. 병동 처방 시 지침약 처방(self 처방) 형식으로 1일분씩 처방

◎ 21년 4차 약사위원회 통과 신약입니다 ◎

약품코드	약품명	구분	성분및 함량/단위	효능	보험 분류	보험코드, 단개(원)	비고
DH-XUL	줄토피 플렉스터치	신규 원내외	1mL 중 insulin degludec 100unit liraglutide 3.6mg	성인 제2형 당뇨병의 혈당 조절을 향 상시키기 위해 다음의 경우에 경구 혈당강화제와 병용 투여.	급여 전문	654400601 3mL/펜	고위험 의약품 2~8℃ 냉장보관, 차광보관
DAMIT	아미티자 연질캡슐 24MCG	신규 원내외	lubiprostone 24μg	1. 성인에서 만성 특발성 변비의 치료 2. 만성 비암성 통증 성인 환자에서 마약성 진통제(opioid) 유발성 변 비의 치료	비급여 전문	696300580	
DAJOVY	아조비 오토인젝터주	신규 원내	fremanezumab 225mg/1.5mL	성인에서의 편두통의 예방	비급여 전문	626900951	차광, 냉장보관 (2~8℃)
DREM2.5	레밋치 연질캡 슐2.5마이크로 그램	신규 원내외	nalfurafine hydrochloride 2.5μg	혈액 투석 환자에서 기존 치료법에 효과가 불충분한 소양증 개선.	비급여 전문	644704020	차광 보관
DSPAS	스파스 몰리트 당의정	신규 원외	tropium chloride 20mg	방광 기능 이상에 의한 빈뇨, 야간다 뇨, 과민성방광, 절박 요실금	급여 전문	642201290	
DH-NATE	나테스토 나잘 겔	신규 원외	testosterone 45mg/g	남성 성선 기능 저하증의 테스토스테 론 대체 치료	비급여 전문	642004211	
DAFST 500	엡스틸라주 500	신규 원내	lonoctocog alfa (혈액응고인자VIII, 유전자재조합) 500IU	A형 혈우병(혈액응고 제8인자의 선 천성 결핍)의 출혈 억제 및 예방, 출 혈 예방 또는 빈도 감소를 위한 일상 적인 예방요법, 수술 전후 예방(외과 적 예방)	급여 전문	500IU: 059700012	냉장 (2~8℃) 보관
DAFST 1000	엡스틸라주 1000		lonoctoco galfa (혈액응고인자VIII, 유전자재조합) 1000IU			1000IU: 059700013	
DAFST 2000	엡스틸라주 2000		lonoctoco galfa (혈액응고인자VIII, 유전자 재조합) 2000IU			2000IU: 059700014	
DORAF	오라팡정	신규 원내	sodium sulfatean hydrous1125mg potassium sulfate 201.07mg 외	대장(X선, 내시경) 검사시의 전 처치 용 장세척	비급여 전문	659901460	

※ 사용 개시일 : 2022년 3월 1일

◎ 신약 정보 ◎

약품명 : 오라팜정 DORAF

성분 :
sodium sulfate anhydrous 1125mg
potassium sulfate 201.07mg
magnesium sulfate anhydrous 102.86mg
simethicone 11.43mg

성상



효능효과 : 대장 (X선, 내시경)검사 시의 전처치용 장세척

금기 : 본제 및 본제의 구성성분에 대해 과민반응, 위장관 폐색, 천공 또는 의심, 위정체, 장폐색

용법 성인 : 분할투여

1) 검사 전날

이른 저녁에 본제 14정을 425mL의 물과 함께 복용, 그 후 1시간 동안 물 425mL를 두 차례 더 복용.

2) 검사 당일

전날 저녁 복용 10~12시간이 지난 후 검사 당일 오전에 추가로 14정을 425mL의 물과 함께 복용, 그 후 1시간 동안 물 425mL를 두 차례 더 복용.

적어도 검사 2시간 전 또는 의사가 지시한 시간까지 본제 복용 및 추가 물 섭취 완료.

아조비 오토 인젝터 주 [DAJOVY (원내)]

성분 : fremanezumab 225mg/1.5mL

작용기전 : CGRP 단클론항체

편두통 통증에 중요한 삼차신경 혈관계의 활성화를 억제

효능효과 : 성인에서의 편두통의 예방

용법 용량

이 약은 1회 225mg을 1개월 간격 또는 1회 675mg(225mg 3회 연속)을 3개월 간격으로 피하 주사한다.

투여 간격을 변경할 경우, 다음 예정일부터 새로운 투여 일정으로 투여한다.

이 약의 투여를 잊은 경우 가능한 한 빨리 투여한다. 이후 최종 투여 일자를 기준으로 이 약의 투여 일정을 정할 수 있다

적용 상의 주의

1) 이 약은 피하 주사로만 사용한다.

2) 이 약은 환자가 자가 투여하도록 계획되었다. 사용하기 전, 환자 및 또는 보호자에게 무균 기법(aseptic technique)을 포함하여 프리필드시린지 또는 오토인젝터를 사용해서 이 약을 준비하고 투여하는 방법에 관하여 적절한 교육을 제공한다.

3) 피하 투여하기 전, 이 약을 30분간 실온에 둔다.

4) 용액 및 용기를 가능한 사용할 때마다, 투여 전 이 약의 미립자 및 변색을 육안으로 검사한다. 용액이 뿌옇거나 육안으로 관찰되는 이물이 있는 경우 이 약을 사용하지 않는다.

5) 복부, 허벅지, 상완 뒤쪽 또는 엉덩이에 이 약을 피하 투여한다. 압통 또는 멍이 있거나 붉은색을 띠거나 단단한 피부 부위에는 주사하지 않는다.

6) 프리필드시린지와 오토인젝터 모두 단회 투여용으로 제공된다.

◎ 사장의약품 관리결과 ◎

과명	약품명	원외	
순환기내과	올메디켈 정 10/40MG	●	2022년 3월 1일 사장 적용됨
	트루셋정80/5/25MG	●	
안과	베토틱에스점안액(외)	●	

약제부 게시판

◎ 생산중단, 품목취하 공지 ◎

의약품	사유	대체약품
에이티피정	제약사 사정에 의해 생산중단.	재고 소진 후 대체약에 대해서는 해당과와 상의하도록 하겠습니다.
바이엘 아스피린정	제약사 사정에 의해 생산중단.	코드불용. 아스피린 프로텍트로 사용 가능
모티리움엠	공급중단	재고소진후 대체약은 해당과와 논의중입니다
할시온 정(원외)	공급 중단으로 인한 코드 불용	트리람0.125mg (DMTRI2), 트리람0.25mg(DMTRI1) 원외 처방가능
이연 니모디핀주	제약사 사정에 의해 생산중단.	삼진 니모디핀 주(DINIM10) 처방 가능 합니다
황산 빈블라스틴 주	제약사의 판매중단에 의해 코드불용	동일 성분의 벨바스틴 주(DC-VELBA) 처방 가능합니다.
판비콤프주	제약사 사정에 의해 생산중단	삐콤펙사 주(DVTBC) 처방 가능합니다.
콜립 정 145/20(DMCHOL1), 콜립 정 145/40(DMCHOL2)	허가취소 관련 급여중지품목	2021년 12월 24일(금)부터 급여 중지됨에 따라 코드불용
바제스타정(DMBAZE)	품목허가취소	2022년 1월 7일부터 코드 불용됨
헤모렉스좌제	생산 중단	헤모렉스 에스 좌제로 변경 예정임 (생산 지연중임)

◎ 품질, 생산지연 공지 ◎

의약품	사유	대체 약품
아디녹스캡슐	해외 공급처의 상황으로 인해 공급에 차질	재고 소진으로 현재 불용중
삼성 타우로리딘 주 250ml	제약사의 공급부족에 따른 품질	동일 성분: 삼진 타우로린 주사 250ml (DW-TAU5GJ) 정상 공급 중입니다.
글락소스미스클라인 백신 공급 일시 중단	문서상 오류가 발견되어 해당 제품들의 추가적인 출고를 일시적으로 전면 중단함 • Tdap 백신(부스트릭스) • MMR백신 (프리오릭스) • 자궁경부암백신(서바릭스: 피부과사용) • 수막구균백신(멘비오)	이는 제품의 안전성, 품질, 효능 등에는 영향이 없는 것으로 현재 사용 중인 제품은 재고 소진 시까지 사용이 가능합니다. 해당 백신 및 이와 유사한 성분의 원내사용 백신의 재고 확보 중이며, 재고 소진 시 대체약에 대해서는 해당 과와 논의 하도록 하겠습니다.
악템라 주 200mg	코로나환자 사용량 증가로 인한 수급 불안정	악템라 400mg와, 80mg 주는 사용가능합니다.
메작탐주	원료수급 및 공정상의 문제로 입고지연	재입고예정 : 22년 4분기 원내 재고 없으며 코드 불용중
아믹탐주	일시품질	아디칸주사액 250mg/2ml (DW-ADIK)가 사용 중
루프린디피에스 11.25MG주	수급 불안정	동일한 효능의 약품인 디페렐린 PR 11.25mg
힐론주, 국제히알루론산 아이주	일시품질	히알루 1% (DO-HYALU1)로 대체
베네프정	위탁사 원료 수급문제로 장기 품질	동일성분: 레그파라25mg (DCCL25) 처방 가능



의약정보

조선대학교병원 의약정보지 2022. 3

PHARMACY NEWSLETTER OF THE CHOSUN UNIVERSITY HOSPITAL

조선대학교병원 약제부 의약정보실

발 행 인 : 장혜영

편집위원 : 박선희, 김경혜