



# 조선대학교병원 의약정보지

PHARMACY NEWSLETTER OF THE CHOSUN UNIVERSITY HOSPITAL

# 의약정보






2022. 8  
Vol.26 No.3

## ◉ 원내 용법주의약품 ◉

약품명	약품사진	성분/성상	정상 투여경로
큐로서프 주 120mg/1.5ml (Vial)		porcine lung extract 120mg 흰색 또는 노란색의 현탁액이 든 무색투명한 바이알제	기관지나 기관내로 투여
보스민 액 50ml (Bottle)		epinephrine 1mg/ml 무색-미황색 액체	기관지 천식: 희석 흡입 국소 출혈: 희석 후 직접 도포 또는 분무
이연 트롬빈 동결건조 분말 5000IU (Vial)		thrombin 5000IU 무색 투명한 바이알에 충전된 유백색의 동결건조제	분무, 관주 또는 분말로 산포
제뉴원 쥘스테인 용액 (Vial)		iodine 5g potassium iodide 10g 갈색 유리병에 든 적갈색의 액	희석 후 복용
네오카프 액 1ml		anhydrous caffeine 10mg (20mg as caffeine citrate) citric acid hydrate 5mg sodium citrate hydrate 8.3mg	녹색: 경구투여
네오카프 주 1ml		무색투명한 액이 바이알에 든 액제	적색: 정맥 투여(주사제)
프로보콜린 산 100mg (Vial)		methacholine 100mg 흰색의 결정성 가루가 든 바이알	희석 후 연무기로 주입
스텐드로 주 1ml		papaverine HCl 17.64mg alprostadil 6µg phentolamine mesylate 0.6mg 백색-미황색의 동결건조 분말이 든 무색투명한 바이알 주사제	음경해면체내 직접 주사
보령 유코미스트 액		acetylcysteine 800mg/4ml 무색투명한 액으로서 약간의 특이한 냄새	분무용법 또는 기관지내 주입법
벤토린 네불 2.5mg		2.5mg as salbutamol 플라스틱 앰플에 든 무색~연한 노란색의 투명한 액제	적절한 흡입기나 분무기(Nebulizer)를 사용하여 흡입
아트로벤트 유디비 흡입액		25mg as ipratropium Br 폴리에틸렌 용기에 든 무색 또는 거의 무색의 투명한 흡입용 액제	간헐적 양압환기 요법기기 또는 적당한 네불라이저를 이용하여 흡입
폴미칸 분무용 현탁액 500mcg/2ml		budesonide 500µg/2ml 플라스틱병에 충전된 균일한 백색-회백색의 점막분무용 현탁액	적당한 분무기를 사용하여 투여

◎ 2022년 2차 약사위원회 통과 약물 ◎

코드	사진	약품명(제약)	구분	성분	효능	용법	비고
DMOLSI		몰시톤 정 4mg [경풍]	신규 원내 외	molsidomine 4mg	협심증의 예방 및 유지 요법(급성 협심증 발작시 응급처치는 제외)	성인: 초회 1회 1~2mg, 1일 2~3회. 필요시 1회 4mg, 1일 3회로 증량 가능. 중증 협심증 치료시 초회 1회 4mg, 1일 2~3회.	
DEQUIF		에퀴피나 필름코팅 정 50mg [에자이]	신규 원내 외	safinamide mesylate 65.88 mg (50mg as safinamide)	운동 동요 증상이 있는 특발성 파킨슨병에서 레 보도파 함유 제제의 보조 요법	레보도파 함유 제제와 병용 투여. 초회 1일 1회 50 mg, 반응과 내약성에 따라 1일 1회 100 mg 증량가능. 식사와 관계없이 복용 가능.	
DZEBI2		제비닉스 정 200mg [한인]	신규 원내 외	eslicarbazepine acetate (micronized) 200mg	새로 뇌전증으로 진단된 성인에서 2차성 전신발 작을 동반하거나 동반하 지 않은 부분발작 치료의 단독요법	음식과 관계없이 복용 가능. 1. 성인: 권장 초기용량 1일 1회 400mg, 1~2주 후 1일 1회 800mg로 증량. 유지용량 1일 1회 800mg, 반응에 따라 1 일 1회 1200mg로 증량 가능.	
DZEBI8		제비닉스 정 800mg [한인]	신규 원내 외	eslicarbazepine acetate (micronized) 800mg	만 6세 이상에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않은 부분발작 치료의 부가요법용	2. 만 6세 이상: 60kg 미만: 권장 초기용량 1일 1회 10mg /kg, 1~2주에 1일 1회 10mg/kg 씩, 최 대 30mg/kg까지 증량 가능. 최대 1일 1회 1,200mg. 60kg이상인 소아는 성인용량 투여.	
DTALEA5		탈리제 정 5mg [다이이찌산쿄]	신규 원내 외	mirogabalin besylate 8.78mg (5mg as mirogabalin)	말초 신경병증성 통증의 치료	식사와 관계 없이 경구투여. 성인 초회 1회 5mg, 1일 2회. 이후 1회 투 여량으로 5mg씩 단계적 증량. 최소 1주일 이상 간격. 최대 1회 15mg, 1일 2회. 1회 투여량을 10~15mg의 범위에서 적절 히 증감. 1일 2회 투여 가능. 주로 신장으로 배설되므로, 신기능이 저 하된 환자에 대해서는 용량이 조절되어 야 한다. 이 약의 투여를 중단할 경우, 복용량을 점차 줄이는 등 신증을 기해야 한다.	
DTALEA10		탈리제 정 10mg [다이이찌산쿄]	신규 원내 외	mirogabalin besylate 17.56mg (10mg as mirogabalin)			
DTALEA15		탈리제 정 15mg [다이이찌산쿄]	신규 원내 외	mirogabalin besylate 26.34mg (15mg as mirogabalin)			
DFEXU40		펙수클루 정 40mg [대웅]	신규 원내 외	fexuprazan hydrochloride 40mg	미란성 위식도역류질환 의 치료	• 1일 1회, 40mg, 4주간. • 식도염이 치료되지 않거나 증상이 계 속되는 경우 4주 더 투여. 식사와 관계없이 투여 가능.	
DCEREBRO		세레브로린 주 10mL [삼오]	신규 원내	proteolytic peptide from porcine brain 215.2mg/mL	알츠하이머형 노인성 치 매, 뇌졸중 후 뇌기능 장 애, 두개골의 외상.	알츠하이머형 노인성치매, 출중후 뇌기 능장애: 1일 5~20mL. 두개골의 외상(뇌진탕, 뇌좌상, 수술 후 외상): 1일 10~50mL. 소아: 1일 1~2mL. 투여기간은 매일 투여로 10~20일 이상. 5mL까지는 근주, 10mL까지는 정주, 10mL ~30mL까지는 0.9% 생리식염주사액 등 에 무균적 혼합 후 약 60분간 정주.	
DADDA		아다벤 주 10mL [프레니지우스카비]	신규 원내	1mL 중 chromic chloride hydrate 5.33μg, copper 38μg, iodine 13μg, ferric chloride hydrate 540μg manganese 5.5μg, sodium fluoride 210μg molybdenum 1.9μg selenium 7.9μg zinc 500μg	정맥 영양 공급시 미량원소 보급	성인 : 미량원소의 일일 기초량이 필요하 거나 일일필요량이 중등도로 증가된 경 우 1일 10mL를 투여한다.  소아(체중 15kg 이상) : 1일 체중 kg당 0.1mL를 투여한다. 이 약은 정맥영양 용액에 희석하여 투여 한다.	

코드	사진	약품명(제약)	구분	성분	효능	용법	비고
DFASEN30		파센라 프리필드시린지 주 30mg [아스트라제네카]	신규 원내	benralizumab 30mg	성인에서 기존 치료에 적절하게 조절되지 않는 중증 호산구성 천식 치료의 추가 유지 요법	권장용량: 30mg 4주 간격으로 3회 피하 주사, 이후 8주 간격 피하 주사	필요시 입고
DSKILA30		스킬라렌스 장용정 30mg [코오롱제약]	신규 원외	dimethyl fumarate (micronized) 30mg	전신치료 대상 성인의 중등도-중증 판상 건선 치료	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 첫 일주일간 1일 1회 본제 30mg 복용 (저녁)</li> <li>• 두번째 주에, 1회 30mg, 1일 2회 복용 (아침, 저녁)</li> <li>• 세번째 주에, 1회 30mg, 1일 3회 복용 (아침, 점심, 저녁)</li> <li>• 네번째 주에, 본제 120mg 1정을 저녁에 복용.</li> <li>• 다섯 번째 주부터 매주 다른 시간에 본제 120mg 1정씩을 연속 5주간 증량</li> <li>• 1일 최대 720mg(1회 240mg, 1일 3회), 최대용량 도달 전 치료효과 있는 경우 추가 증량 불필요. 반드시 식사 중 또는 식 직후 물과 함께 복용, 자르거나 녹이거나 씹어서 복용하지 않음.</li> </ul>	
DSKILA120		스킬라렌스 장용정 120mg [코오롱제약]	신규 원외	dimethyl fumarate (micronized) 120mg			
DCIBIN100		시빈코 정 100mg [화이자]	신규 원외	abrocitinib 100mg	전신요법 대상 만 12세 이상의 중등증-중증 아토피 피부염의 치료 (1일 1회 복용)	1. 권장용량 권장 시작용량 200mg. 만 65세 이상, 만 12~17세 및 본제 이상반응 발생 위험인자 보유하거나 내약성이 낮은 경우 권장 시작 용량 1일 1회 100 mg. 지속 투여 용량은 가장 낮은 유효한 용량 고려, 1일 최대 200mg.  2. 투여방법 음식물 섭취와 상관없이 매일 거의 같은 시간에 1일 1회 경구투여. 통째로 물과 함께 삼켜야 하며, 쪼개거나 으깨거나 씹지 않음	
DCIBIN200		시빈코 정 200mg [화이자]	신규 원외	abrocitinib 200mg			

– 신약 사용개시일 : 2022년 8월 16일 예정

### ◎ 사용량 부진 의약품 코드 삭제 ◎

약품코드	약품명	구분	결과
DEARID	아리돌 흡입용 캡슐 콤비팩	원내	코드삭제
DIATRI	아트리 플러스 주 20mg	원내	코드삭제
DIINTR4	인베가 트린자 주사 819mg	원내	코드삭제
DHBIGJ10	정주용 헤파불린 에스엔 주 10ml	원내	코드삭제
DIFBRO3V	파이브로베인 주 3%(VIAL)	원내	코드삭제
DI-EMEPT	메프친 스윙헬러	원외	코드삭제
DMMEL01	멜로덱스 캡슐 7.5mg	원외	코드삭제
DMBAM	밤부톨 정 10mg	원외	코드삭제
DTLVD600	세비보 정	원외	코드삭제

약품코드	약품명	구분	결과
DMABOD15	아빌리파이 오디 정 15mg	원외	코드삭제
DZEPAT	제파티어 정	원외	코드삭제
DMJULI	줄리안 정 15mg	원외	코드삭제
DMCOSA	코살린 정	원외	코드삭제
DD-CONG20	콘투락투박스 겔 20g	원외	코드삭제
DMCLAS	클라리틴 시럽	원외	코드삭제
DH-CLO	클로미펜시트르산염 정	원외	코드삭제
DMTEGS	테그레톨 시럽 2%	원외	코드삭제
DI-EFLUT3	플루테롤 흡입용 캡슐 500/50	원외	코드삭제

## 약제부 게시판

### ◎ 생산중단/일시품절 ◎

	약품명	사유	입고예정 및 대체약 안내	대체약 코드
5월	아토크 정 20mcg, 40mcg	생산중단	재고 소진 후 대체약 없으며 유사계열 사용	
	헤모렉스 좌제	생산중단	대체약: 헤모렉스 에스 좌제	DSP-HEMOS
	호쿠날린 패취 0.5mg, 1mg, 2mg	생산중단	원내 재고 소진 후 해당과 논의 예정	
	노보믹스 50 플렉스 펜 주	일시품절	재고 소진 후 대체약: 휴마로그믹스 50퀵펜 주 사용예정	DH-HLM50P
	움카민 시럽	일시품절	재공급일까지 사용 가능할 것으로 예상됨	
	윌리진 캡슐	일시품절	공급지연, 유사효능약품: 알타민 캡슐, 트리엔탈 캡슐(원외)	
	타리민 정	일시품절	5월말 재공급예정이었으나 현재는 품절 해제됨	
	페노시드 캡슐	일시품절	유사효능약품: 리피딜 슈프라 정, 재공급예정 7월이었고 현재는 품절 해제됨	
6월	비타판트 주 50mg	수입중단	대체약: 알리마 주 20mL	DVITALI
	아이브이에프 엠 주	생산중단	대체약: 아이브이 에프엠 에이치피 주 75IU	DH-IVFM75
	크라포란 주 1g	생산중단	중근당 세포탁심 주 1g으로 대체됨	DW-CEFO1
	히알 플러스 주 0.95mL	회수조치 일시품절	1. "EO 가스 추가 멸균 허가 변경 후 진행되는 장기 안정성 3개월 시험 결과 시험 기준 이탈"이 확인되어 일부 제조번호 회수 2. 사용가능한 제조번호는 일시품절로 원내 재고 소진 후 재입고시까지 코드 불용 예정	
	디아그노그린 주	일시품절	재고 소진 후 대체약 구입은 해당과와 논의예정	
	답토마이신 주 350mg	생산중단	대체약: 답토신 주 350mg	DW-DAP1
	답토마이신 주 500mg	생산중단	대체약: 답토신 주 500mg	DW-DAP2
	리피덴 주 250mL	일시품절	유사효능약품인 리피덴 주 500mL(규격 다름)가 있으며 현재는 품절 해제됨	DAM-ILIP500
	보스민 액 50mL	일시품절	재고 소진 후 대체약 없음, 6월말 재공급 예정이었으나 현재는 품절 해제됨	
	나라돌 주	생산중단	대체약: 나라돌 바이알 주 500	DNALAV
	레보멜스 주	생산중단	대체약: 헤파멜즈 주	DHEPA-M
	아코신 주	일시품절	원내 재고 소진 후 코드 불용, 원내 유사효능약품: 아디칸 주, 토브라 주, 겐타마이신 주	
	묵틴 캡슐 200mg	일시품절	대체약: 뮤테란 캡슐 200mg	DMUTE
	에스케이 티디백신 주	생산중단	생산중단으로 공급 불안정하여 녹십자 티디백신으로 대체됨	DV-GRTD DV-GRTD-E
	알 액	일시품절	원내 재고 소진 후 코드불용, 유사효능약품: 렉크린 액 133mL	DLENE
	이솜토키핀 2% 점안액	일시품절	원내 재고 소진 후 대체약에 대해 해당과와 논의	
	도란사민 캡슐	일시품절	원내 재고 소진되어 코드 불용됨	
7월	맥시부펜 이알 정 300mg	일시품절	원내 재고 소진되어 코드 불용됨 동일성분약품: 디롤 정 400mg(함량제형 다름)	DMDIRO
	모티리움 엠 정	일시품절	원내 재고 소진되어 코드 불용됨, 대체약: 돔프린 정 10mg	DDOMP
	휘브릭스 주 50mg/5mL	일시품절	원내 재고 소진 후 코드 불용	
	졸레어 주	생산중단	재고 소진되어 코드불용 되었으며 대체약(졸레어 프리필드시린지 주 150) 사용 중	DXOLP150
	이수푸렐 주 0.2mg	생산중단	원내 재고 소진 후 코드불용 예정, 대체약: 의태 프로테르놀렐 주0.2mg	DISUP2
	피알디 0.1% 현탁액	일시품절	원내 재고 소진 후 코드 불용예정, 원내 피알디 0.3% 현탁액도 공급 원활하지 않음	
	빈크란 주 1mg	일시품절	원내 재고 소진되어 코드불용, 대체약(화이자 빈크리스틴 주 2mg) 소량 입고 후 소진됨, 재입고 예정일 9월	DC-VINCPF2
	하이드라섹 산 10mg	일시품절	원내 재고 소진 후 코드 불용, 재공급 예정일 2023년 1월	
	마트리펜 패취 12mcg/h	수입중단	재고 소진 되어 코드 불용, 대체약: 듀로제식 패취 12mcg/h	DN-FTD12P
	마트리펜 패취 25mcg/h	수입중단	원내 사용 중인 듀로제식 패취 25mcg/h와 동일 함량, 크기 다름	DN-FTD25P
	울티바 주 1mg	일시품절	원내 재고 소진 후 9월 입고예정, 원내 동일효능약품: 레미바 주 2mg, 5mg (용량 다름)	DN-IREMIV2 DN-IREMIV5
	녹십자 알부민 주 5% 250ml	일시품절	동일효능약품: 에스케이 알부민 주 5% 250mL도 처방가능하나 공급 불안정	DALBSK5



# 의약정보

조선대학교병원 의약정보지 2022. 8

PHARMACY NEWSLETTER OF THE CHOSUN UNIVERSITY HOSPITAL

조선대학교병원 약제부 의약정보실

발행인: 장혜영

편집위원: 박선희, 오재기, 김소영